

nasiona na czasie

k a t a l o g



nasiona:

warzyw

kwiatów

ziół

na kielki

mikrolistki

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprezentować nowy katalog oferowanych przez nas produktów.

Przedstawia on gatunki warzyw, kwiatów, ziół i roślin przyprawowych, jak również szeroką gamę gatunków dedykowanych do produkcji kiełków. Nasze nasiona polecamy do ogródków przydomowych, na działkę i do produkcji towarowej, jak również na balkon.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom postaraliśmy się, aby katalog spełniał oprócz walorów użytkowych, również informacyjne, poszerzające ogólną wiedzę o gatunkach czy grupach uprawnych. Katalog przedstawia grupy tematyczne, które staraliśmy się uszeregować nie zawsze zgodnie z systematyką, a bardziej z grupą użytkową.


Oferta jak zawsze oparta jest o najwyższe standardy materiału siewnego, który pozyskujemy od najlepszych plantatorów i producentów krajowych i zagranicznych. Dodatkowo, aby zapewnić jak najwyższą jakość bardziej wrażliwych gatunków przeprowadzamy ich ozonowanie.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zaznajomienia się z katalogiem mając nadzieję, że pozwoli on Państwu na jeszcze korzystniejsze spojrzenie na naszą ofertę i zachęci do skorzystania z jej zawartości. Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. Służymy fachową radą i profesjonalną obsługą.

*Z poważaniem
Prezes Zarządu*



Elżbieta Lewandowska



TORSEED

Przedsiębiorstwo

Nasiennictwa Ogrodniczego

i Szkółkarstwa S.A. w Toruniu

ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń; tel. 56 658 48 00

www.torseed.pl; torseed@torseed.pl



Sekretariat tel. 56 658 48 10
sekretariat@torseed.pl fax 56 659 89 31

Dział Obrotu Materiałem Siewnym

Kierownik tel. 56 658 48 56
Realizacja Zamówień tel. 56 658 48 34
oms@torseed.pl tel. 56 658 48 70

Eksport

eksport@torseed.pl tel. 509 669 281

Dział Marketingu

Kierownik tel. 509 669 340
Dział tel. 519 339 605
marketing@torseed.pl tel. 504 239 552

Magazyn Nasion Torebkowanych

Kierownik tel. 504 239 564
Dział tel. 56 658 48 60
mt@torseed.pl

Dział Rozliczeń Finansowych

Kierownik tel. 504 239 553
Rozliczenia tel. 504 239 578
fk@torseed.pl



s p i s t r e ś c i

Nasze programy	2	Rośliny różne	42
Dane dotyczące uprawy nasion	5	Mieszanki warzywne	44
Buraki ćwikłowe	6	„ZDOBIĄ, SMAKUJĄ, LECZĄ”	45
Warzywa cebulowe	8	Nasiona na taśmie	46
Warzywa dyniowate	11	Nasiona NANO-GRO	47
Warzywa strączkowe	14	Nasiona otoczkowane	48
Warzywa kapustne	18	Kiełki	49
Kopry	21	Rośliny zielarskie i przyprawowe	52
Marchwie	22	Mikrolistki	56
Pietruszki	24	Opakowania dla producentów	57
Ogórki	25	Kwiaty jednoroczne	58
Papryki	28	Kwiaty dwuletnie i byliny	70
Pomidory	30	Kwiaty szklarniowe	77
Rzodkiewki	34	Mieszanki kwiatowe	78
Salaty	36	Trawy gazonowe	79
Warzywa liściaste	39	Ekspozytory	80

nasze programy

podstawowy

warzywa



kwiaty



zioła





t a ś m a



o t o c z k i



nano gro®



g r a s p a p i e r



k i e t k i

charakterystyka opakowania

Gatunek

Odmiana

Wczesność i typ

Szczególne walory wyróżniające

Nazwa gatunku w 6-ciu językach obcych


Informacja o gwarancji jakości

Skrócony opis uprawy
w języku polskim oraz w językach obcych

Skrócony opis uprawy
w formie piktogramów

Dane kontaktowe

Paszport roślin zawierający informacje
dotyczące pochodzenia nasion



Pomidor - Pomidor - Pomidor - Pomidor - Pomidor - Pomidor



Logo firmy

Zdjęcie danej odmiany

Przydatność do użytkowania
oraz określenie programu
i miejsca uprawy

Potwierdzenie spełnienia norm

Kod EAN umożliwiający
elektroniczną identyfikację

Informacje określające nr partii, gramaturę
oraz okres przydatności do siewu

Gatunek	Produkcja z rozsady	Wysiew do gruntu	Orientacyjna ilość nasion w 1 g	Termin wysiewu (rozsada / grunt)	Ulica dni od wysiewu do wschodów	Zapotrzebowanie nasion w g/ar (rozsada / grunt)	Termin sadzenia do gruntu
Bob		•	0,5 – 0,7	III – IV	8 – 14	3000 – 4000	-
Brokuł włoski	•		330 – 400	III – V	6 – 10	3 – 5	IV – VI
Brukiew	•	•	300 – 450	k. IV – V rozsada / k. IV – p. V grunt	6 – 10	6 / 30	k. VI – ½ VII
Burak /wikłowy		•	50 – 80 kłeb. / 75 – 150 nas.	10 IV – 30 VI	10 – 14	120 – 200	-
Burak liściowy		•	50 – 80 kłeb. / 75 – 150 nas.	½ IV – VI	10 – 14	120 – 200	-
Cebula		•	250 – 300	III – IV	7 – 12	40 – 60	-
Cebula siedmiolatka	•	•	300 – 450	IV rozsada / IV, VIII grunt	7 – 12	30 / 30 – 40	VI
Cykoria liściowa		•	600 – 800	½ V – ½ VI	14 – 21	30 – 60	-
Dymia ołbrzymia		•	1 – 2	½ V	6 – 10	20 – 30	-
Dymia zwyczajna		•	6 – 12	½ V	6 – 10	30 – 40	-
Fasola n/s. ziarna karłowa		•	2 – 3	½ V	6 – 10	700 – 2000	-
Fasola n/s. ziarna tycina		•	0,6 – 1	10 – 15 V	6 – 10	600 – 900	-
Fasola szp. karłowa		•	3 – 4	10 V – ½ VII	6 – 10	500 – 1300	-
Fasola szp. tycina		•	3 – 4	½ V	6 – 10	600 – 900	-
Groch		•	5 – 8	III – ½ IV	6 – 12	1500 – 3000	-
Jarmuż	•	•	300 – 400	V – VI rozsada / VI – VIII grunt	6 – 10	6 / 20 – 30	VII
Kalafior wczesny	•		330 – 400	III – ½ IV	6 – 10	5 – 6	V
Kalafior późny	•		330 – 400	k. V – ½ VI	6 – 10	10	VII
Kalarepa	•	•	350 – 400	IV – V	5 – 10	10	V – VII
Kapusta brukselska	•		350 – 400	½ IV – p. V	6 – 10	5 – 6	½ VI – p. VII
Kapusta gł. wcz. i. śr. wcz.	•		250 – 300	k. I – ½ III	6 – 10	6 – 8	½ IV – ½ V
Kapusta gł. późna	•	•	250 – 300	k. III – ½ IV	6 – 10	6 / 15	k. V – ½ VI
Kapusta pekińska		•	350 – 400	20 – 31 VI	5 – 10	30 – 40	-
Karczoch	•		15 – 25	k. II – p. III	7 – 12	20	k. V
Kawon (arbuz)	•		10 – 20	k. II – ½ III	7 – 12	3 – 4	k. V – p. VI
Koper		•	600 – 800	III – ½ VII	8 – 12	200 – 1000	-
Kukurydza kukowa		•	3 – 7	½ V	7 – 14	400 – 500	-
Majorenek ogrodowy	•	•	4500 – 5000	III rozsada / III – ½ IV grunt	7 – 21	2 – 3 / 10 – 15	½ V
Marchew		•	500 – 1000	III – V, XI	14 – 21	60 – 100	-
Melon	•		20 – 30	IV	8 – 12	3 – 4	k. V – p. VI
Oberżyna	•		240 – 280	½ III	10 – 20	5 – 6	k. V – p. VI
Ogórek gruntowy		•	30 – 60	½ V – ½ VI	6 – 10	50 – 80	-
Papryka	•		150 – 200	½ III – p. IV	10 – 20	5	k. V – p. VI
Pastersak		•	200 – 250	III – ½ IV	14 – 28	60 – 80	-
Pietruszka liściowa		•	550 – 600	III – IV	14 – 28	60 – 70	-
Pietruszka korzeniowa		•	850 – 950	III – IV, XI	14 – 28	50 – 70	-
Pomidor	•		220 – 400	½ III – p. IV	7 – 14	2 – 3	½ V – ½ VI
	koktajlowy	•	600 – 700	½ III – p. IV	7 – 14	1 – 2	½ V – ½ VI
Por	•	•	350 – 400	p. III rozsada / III – ½ IV grunt	7 – 12	15 / 30 – 40	½ IV – V
Poziołk bezroglowa	•		2000 – 3000	k. II – p. VII	7 – 28	1 – 2	Stos. do terminu siewu
Rzapa		•	450 – 700	IX, VII	5 – 12	30 – 40	-
Rodkiew		•	130 – 150	IV, k. VI – VII	3 – 8	60 – 80	-
Rodkiewka		•	100 – 160	III – V, VII	3 – 8	150 – 400	-
Salata głowiasta masłowa	pod osłoną	•	900 – 1500	½ II – III	6 – 10	4 – 5 / 8 – 10	Stos. do terminu siewu
	calosazonowe	•		p. IV – p. IX			
	włosna – jesień	•		p. IV, VIII – p. IX			
Salata krucha	•	•	900 – 1500	k. II – ½ VII rozsada / p. V – ½ VI grunt	6 – 10	3 – 4 / 6 – 8	Stos. do terminu siewu
Seler korzeniowy i liściowy	•		1500 – 2000	½ II – p. III	15 – 20	1	½ V – ½ VI
Skorzonera		•	75 – 130	III – IV	14 – 21	150 – 200	-
Szczaw		•	1060 – 1500	IV, VII	7 – 12	50	-
Szczypiorek	•	•	600 – 800	III – IV rozsada / IV grunt	5 – 10	5 – 7 / 30	V
Szparag	•	•	40 – 60	1 – 10 IV rozsada	8 – 16	15 / 20 – 25	1 – 20 IV
Szpinak		•	70 – 120	II – ½ IV, k. VII – ½ IX	14 – 24	200 – 400	-

buraki ćwikłowe

Burak ćwikłowy pochodzi od form buraka dzikiego, naturalnie rosnącego w basenie Morza Śródziemnego. Pierwsze wzmianki o buraku pojawiły się już w dokumentach babilońskich. Natomiast w średniowieczu uprawiano buraki ćwikłowe jako warzywo liściaste na dworze Karola Wielkiego. Warzywo bogate w szereg witamin i minerałów, a dzięki dużej zawartości pektyn korzystnie wpływa na trawienie. Korzenie zawierają betaninę, z której produkuje się naturalne barwniki spożywcze. Buraki są dość wrażliwe na spadki temperatury poniżej 0°C, szczególnie w fazie liśnienia. Roślina o największym zapotrzebowaniu wodnym w okresie kiełkowania i wschodów oraz przyrostów korzenia. Wymaga gleb dość przepuszczalnych piaszczysto-gliniastych o dużej zawartości próchnicy.



Śnieżna Kula


*jedyna odmiana
białego buraka
ćwikłowego*

Korzeń kulisty o gładkiej skórze. Miąższ wyjątkowo smaczny o wysokiej zawartości suchej masy (ok. 16 %) i cukrów (ok. 11 %). Doskonały do konserwowania (kostka, plastry). W mieszankach nie barwi jasnych warzyw. **Przydatny także do robienia mrożonek, zapiekanek i białego barszczu.**



Czerwona Kula

Popularna i bardzo plenna odmiana o kulistych korzeniach. Nadaje się do użytkowania letniego, jesiennego oraz do przechowywania zimowego. **Odmiana bardzo plenna – ponad 70 t/ha.**



Opolski

Bardzo smaczna późna odmiana o cylindrycznych korzeniach. Nadaje się do bezpośredniego spożycia, przechowywania oraz do przetwórstwa, doskonała do konserwowania.



burak

Odmiana	Okres wegetacji (dni)	Korzeń		Przydatność			Uwagi
		Kształt	Kolor miąższu	Bespośrednie spożycie	Przetworstwo	Przedmrożenie	
Czerwona Kula 2 	108-110	kulisty	intensywnie czerwony	***	***	***	Popularna odmiana, niezwykle smaczna o wszechstronnym zastosowaniu.
D'Egypte	90-100	plaski	ciemnoczerwony	***	*	**	Wczesna odmiana, polecana do uprawy na pęczki.
Jawor	110-120	kulisty	intensywnie czerwony	***	***	***	Odmiana bardzo pełna, miąższ delikatny, bardzo smaczny. Wysoka zawartość barwników.
Kier	109-110	cyldryczny	ciemnoczerwony	***	***	***	Odmiana bardzo pełna o dużym udziale korzeni handlowych w plonie ogólnym. Wysoka zawartość barwników.
Nochowski	109-110	kulisty, lekko wydłużony	karminowoczerwony	***	***	***	Odmiana o wysokim poziomie betaniny, dobry surowiec dla przetwórstwa i produkcji naturalnych barwników.
Okrągły Ciemnoczerwony	110-120	kulisty	ciemnoczerwony	***	***	***	Odmiana polecana na wczesny zbiór pęczkowy i do długiego przechowywania. Wysoka zawartość barwników.
Opolski 	110-115	cyldryczny	karminowoczerwony	***	***	***	Odmiana bardzo pełna o dużym udziale plonu handlowego, polecana do produkcji soków. Bez tendencji do tworzenia pierścieni.
Śnieżna Kula 	105-110	kulisty	biały	***	***	***	Jedyna odmiana białego buraka ćwikłowego o wyjątkowo smacznym miąższu. Dostarcza do mieszanek warzywnych konserwowanych i soków.

* przydatna ** polecana *** przeznaczona

warzywa cebulowe

Nazwa grupy *Allium*, w skład której wchodzi m.in. cebula zwyczajna, cebula siedmiolatka, czosnek pospolity, szczypiorek ogrodowy, szalotka i por, pochodzi z celtyckiego języka, gdzie „all” to piękny, ostry. Warzywa te pochodzą z Azji, a dokładnie z Persji skąd zawędrowały do Egiptu i Europy. Początkowo uprawiane w celach spożywczych, a dopiero później odkryto ich właściwości lecznicze. Grupa roślin wymagająca żyznych gleb i dobrego nasłonecznienia. Najlepszym przedplonem dla roślin cebulowych są warzywa strączkowe lub dyniowate. W plodozmianie nie powinny wracać na to samo miejsce częściej niż co 3-4 lata.



Octavia



Średniowczesna odmiana wyrównana pod względem kształtu i wielkości cebul.

Odmiana polecana także do siewu jesennego (II dekada września).



Torunianka



Odmiana średniowczesna do uprawy z siewu wiosennego. Wyróżnia się przydatnością do bardzo długiego przechowywania i słabą skłonnością do wybijania w pędy nasienne.

Tolerancyjna na mączniaka rzekomego. Pionuje stabilnie na poziomie 50 t/ha.



Sopelek



Odmiana późna, bardzo plenna o dużej trwałości w przechowywaniu.

Mięsz biały i jędrny o dość ostrym smaku.



Wolska



Odmiana średniowczesna (ok. 135 dni), równomiernie załamująca szczypior. Wiernie plonuje niezależnie od warunków wegetacji. Cebule 100-150 g o dość łagodnym smaku, przydatne do przechowywania przez okres 5-6 miesięcy.
Z uwagi na kształt - łatwa do krojenia, a ilość odpadów jest bardzo niewielka.



cebula

Odmiana	Wczes- ność	Kształt	Masa [g]	Kolor		Przydatność			Uwagi
				Skórka	Miążdż	Bezpośrednie spożycie	Przetwa- dzenie	Przech- owywanie	
Alisa Craig	późna	owalny- lekko wydł.	do 1000	jasnożółta	białokremowy	***	**	*	Salatkowa; typ Exhibition
Alibaba	średnio- późna	kulisty	80-100	biała	biały	***	***	*	Salatkowa
Avalon	średnio- późna	kulisty	115	biała	biały	***	**	**	Salatkowa
Borettana	średnio- wczesna	plaska	40-50	żółta	kremowożółty	***	**	**	Do grillowania, marynowania i na szaszłyki.
Globo	późna	owalny	300- 800	ślimkowatożółta	biały	***	**	*	Salatkowa; typ Exhibition
Karmen	średnio- późna	kulisty	90-100	czerwono- fioletowa	fioletowo-biały	***	**	***	
Octavia	średnio- wczesna	kulisty	100-130	żółta	biały	***	***	***	Mocny system korzeniowy. Również siew jesienny.
Sopelek	średnio- wczesna	wydłużony (soplekowi)	100-150	ciemnosłomkowa	biały	***	***	**	Doskonała na szaszłyki.
Torunianka	średnio- wczesna	kulisty	140-150	żółto-brązowa	biały	***	***	***	Tolerancyjna na mączniaka rzepekowego.
Wenta	średnio- późna	kulisto-romb.	90-100	czerwona	fioletowo-biały	***	**	***	
Wolska	późna	kulisto-romb.	90-160	ślimkowatożółta	biały	***	***	**	

* przydatna ** polecana *** przeznaczona



por

Odmiana	Wczesność	Długość łodygi rzekomej (cm)	Przydatność do zimowania w gruncie	Uwagi
Bartek	późny	20 – 30	•	zbiór jesień / wiosna
Bluegreen Winter – typ Arkansas	bardzo późny	20 – 30	•	zbiór jesień / wiosna
Bułgarski Revent – typ Varna	wczesny	60 – 70	-	typ bułgarski, zbiór letni
Carentan 3	średniopóźny	30 – 40	-	zbiór jesienny
Elefant	późny	30 – 40	-	zbiór jesienny
Herbstriesen 2 – typ Autumn Giant2	wczesny	30 – 40	-	zbiór letni / jesienny

• przydatny

- nie przydatny

Według systematyki roślin cukinia jest dynią zwyczajną. Znajdują się w tej grupie cukinie o różnych kształtach i kolorach skórki.

warzywa dyniowate cukinia



cukinia

Odmiana	Wczesność	Kształt owoców	Kolor skórki	Kolor miąższu	Uwagi
Astra Polska	bardzo wczesna	maczugowaty	ciemnozielony w jasne drobne cętki	jasnokremowy	Odmiana smaczna, wykazująca dużą odporność na choroby typowe dla roślin dyniowatych.
Astra Polska F1	wczesna	cyldryczny	żółtopomarańczowy	kremowy	Wysoki plon młodych owoców, doskonała do konserwowania.
Bianca Di Trieste	wczesna	maczugowaty	kremowoseledynowy	białokremowy	Odmiana bardzo plenna, szybko rosnąca, o krzaczastym typie wzrostu.
Black Beauty	wczesna	cyldryczny	ciemnozielony	jasnokremowy	Polecana do konserwowania, duszenia, smażenia, zapiekania. Miąższ smaczny i kruchy.
Coucourzelle	bardzo wczesna	cyldryczny	zielony z jasnymi smugami	białokremowy	Bardzo plenna odmiana o krótkim okresie wegetacji. Możliwość uprawy na balkonie i tarasie.
Nimba	wczesna	maczugowaty	jasnozielony z ciemnozielonymi smugami	jasnokremowy	Odmiana o krzaczastym pokroju, bardzo plenna, duże wymagania glebowe.
Soraya	średniowczesna	maczugowaty	ciemnozielony z delikatnymi zielonymi smugami	białokremowy	Bardzo szybko wiąże owoce, nawet jeśli temperatury nie są zbyt wysokie. Miąższ smaczny, soczysty i bardzo kruchy.
Striato d'Italia	wczesna	maczugowaty	ciemnozielony z jasnozielonymi smugami	białokremowy	Odmiana o krzaczastym pokroju, smacznych i atrakcyjnych owocach.
Tondo chiaro di Nizza	bardzo wczesna	okrągły	jasnozielony z delikatnymi zielonymi smugami	kremowobiały	Możliwa uprawa w pojemnikach. Młode owoce doskonale nadają się do faszerowania i zapiekania.
Zaboda	wczesna	maczugowaty	zielony lekko marmurkowy	białokremowy	Owoce z bardzo małą komorą nasienną. Doskonale nadają się na pikle.

Grupa roślin dyniowatych obejmuje m.in. gatunki takie jak dynia olbrzymia, cukinia, patison, melon i arbuz. Rośliny pochodzą z Ameryki Południowej, a do Europy sprowadzone zostały przez Krzysztofa Kolumba. Grupa roślin o wielkiej zmienności kształtów, barwy oraz różnej grubości skórki i koloru miąższu. Sama dynia ma aż 45 typów, z których najważniejsze to dynia zwyczajna, makaronowa, płaszowa, olbrzymia, czy typ Hokkaido. Są to rośliny niskokaloryczne o wysokiej zawartości błonnika, karotenu oraz witamin A, C, B1, B2 oraz żelaza, potasu i manganu, a także lecytyny. Pestki mają dużą wartość odżywczą i zawierają kwasy omega-3. Warzywa dyniowate nadają się do zup, sosów, jako nadzienie lub do faszerowania czy konserwowania. Rośliny o wysokich wymaganiach pokarmowych i wodnych, które są bardzo wrażliwe na niskie temperatury.



Odmiana	Grupa klasyfikacji	Kolor skórki	Kolor miąższu	Waga	Uwagi
Amazonka	olbrzymia	pomarańczowy	pomarańczowy	1 – 1,5 kg	Do bezpośredniego spożycia i do przetworów. Polecana do dłuższego przechowywania. Wysoka zawartość suchej masy.
Ambar	olbrzymia	zielony	pomarańczowy	2 – 4 kg	Wysoka zawartość suchej masy, zwarty miąższ.
Bambino	olbrzymia	pomarańczowy	ciemnopomarańczowy	5 – 15 kg	Miąższ kruchy, zawierający dużo karotenu i wit. C.
Big Max	olbrzymia	różowopomarańczowy	pomarańczowy	30 – 50 kg	Bardzo smaczny miąższ, zawierający dużo cukru i karotenu. Doskonale do tworzenia ośdobnych lumpionów.
Goliath	olbrzymia	pomarańczowoczerwony	intensywnie pomarańczowy	30 – 50 kg	W wyjątkowo dobrych warunkach potrafi dorosnąć nawet do 70 kg.
Melonowa Żółta	olbrzymia	pomarańczowy	żółtopomarańczowy	25 – 30 kg	Odmiana bardzo pełna, o soczystym i jędrnym miąższu.
Rouge vif d'Étampes	olbrzymia	ciemnopomarańczowy	pomarańczowy	5 – 15 kg	Bardzo dekoracyjne (silnie brudowane) owoce, o bardzo smacznym miąższu.
Uchiki Kuri	olbrzymia	pomarańczowoczerwony	ciemnopomarańczowy	1,5 – 2 kg	Odmiana typu Hokkaido, o bardzo przyjemnym kasztanowym smaku.
Waltham Butternut	piżmowa	żółtozielony	żółty	1,5 – 3,5 kg	Miąższ o słodko-orzechowym smaku, z wysoką zawartością białka, węglowodanów, beta-karotenu oraz składników mineralnych. Doskonale na frytki. Polecana na dłuższe przechowywanie.
Miranda	zwyczajna - bezłupinowa	jasnozielony; w miarę dojrzewania kolor zmienia się na zielono-pomarańczowy	pomarańczowy	3 – 4 kg	Nasiona bez łupiny nasiennej, o wysokiej wartości dietetycznej i zdrowotnej.
Danka Polka	zwyczajna - na nasiona	zielono-pomarańczowy	jasnopomarańczowy	2,5 – 3 kg	Owoce o cienkim miąższu, wypełnione dużymi, białymi i bardzo smaczными nasionami w ilości ok. 500-600.
Makaronowa Warszawska	zwyczajna - makaronowa	pomarańczowy	żółtopomarańczowy	1,5 – 2,5 kg	Miąższ po obróbce termicznej (gotowaniu lub prażeniu) rozpada się na nitki, które przypominają wyglądem makaron spaghetti.

patison



kabaczek



warzywa strączkowe

Rośliny strączkowe, inaczej matylkowe grubonasienne, należą do rodziny bobowatych o dużych nasionach. Stanowią największą rodzinę roślin (liczącą ok. 18000 gatunków). Są drugą po zbożach grupą roślin o najważniejszym znaczeniu w żywieniu ludzi. Uprawiane są głównie dla nasion, paszy i jako zielony nawóz. Rośliny o niskim indeksie glikemicznym nie powodujące gwałtownego wzrostu poziomu glukozy we krwi. W naszych warunkach klimatycznych najchętniej uprawiane są: fasola zwykła i wielkokwiatowa, groch łuskowy i cukrowy, bób oraz fasolnik. Wśród bobów mamy formy samokończące. Natomiast wśród fasoli mamy formy szparagowe jak i na suche nasiona, z których najbardziej znana jest odmiana Piękny Jaś. Rośliny o relatywnie krótkim okresie wegetacji, a dzięki asymilacji azotu z powietrza stanowią jeden z najlepszych przedplonów.

Cud Kelvedonu



Odmiana wczesna, łuskowa o nasionach pomarszczonych. Nasiona duże, kuliste, pełne, po 6-7 sztuk w strąku.



Sześciotygodniowy



Odmiana bardzo wczesna. Nasiona gładkie i równomiernie dojrzewające. Strąki jasnozielone o długości do 9 cm.



groch

Typ / Odmiana	Długość okresu wegetacji (dni)	Wysokość roślin (cm)	Masa tylnąca nasion (g)
CUKROWY			
Ambrosia	70	80	150-160
Carouby - tyczkowy	75-80	150-160	180-200
Hrabia	70	100	150-160
Ilwitecki	85	45-55	180-200
ŁUSKOWY			
Alderman - tyczkowy typ Telefon	85	180	180-200
Cud Kelvedonu - nasiona pomarszczone	78-80	45-60	200-250
Sześciotygodniowy - nasiona gładkie	60-65	90-100	220-250

typ cukrowy

Strąki grochu cukrowego nie posiadają wyściółki pergaminowej, dlatego mogą być spożywane na surowo lub po ugotowaniu w całości.

typ łuskowy

W grochu łuskowym ze względu na wyściółkę pergaminową konsumuje się wyłącznie nasiona.

b ó b

Windsor Biały



Odmiana średniowczesna, pełna. Wysokość rośliny do 120 cm. Nasiona duże, zielonobiałe i bardzo smaczne, nadające się do bezpośredniego spożycia, konserwowania i mrożenia.



Karmazyn

f a s o l a

Złota Saxa

Bardzo wczesna odmiana szparagowa żółtostrąkowa. Smaczna, nadaje się do bezpośredniego spożycia, jak również do przetwórstwa (mrożonki, konserwy). Polecana do przyspieszonej uprawy w tunelach nieogrzewanych i pod agrowłókniną.

Jagusia

Odmiana średniowczesna, amatorska, szparagowa, zielonostrąkowa z możliwością użytkowania na suche nasiona. Roślina wysokości około 50 cm, o wyjątkowo sztywnych i mocnych pędach. Odmiana wysoce tolerancyjna na chłody podczas wschodów oraz choroby grzybowe. Strąki bezwłókniste, wyjątkowo smaczne, bez tendencji do przejrzenia. Nasiona barwy ciemnobordowej o delikatnym, niepowtarzalnym smaku. Plonuje wiernie niezależnie od warunków wegetacji.

Piękny Jaś

Późna odmiana fasoli wielokwiatowej przeznaczona na suche nasiona. Roślina wysokości do 300 cm. Polecana do bezpośredniego spożycia oraz konserwowania. Nasiona białe i błyszczące (waga 1000 nasion - 1,5-1,8 kg). Strąki dojrzewają stopniowo, aż do pierwszych przymrozków.

Igołomska

Odmiana wczesna, bardzo plenna, niezawodna w uprawie na zbiór suchych nasion. Polecana również do przetwórstwa. Nasiona średnie do dużych (waga 1000 nasion - ok. 400 g), białe, lekko żyłkowane, smaczne o wysokiej zawartości białka (24%). Rośliny dorastają do 50 cm. Są odporne na wyleganie i mało porażane przez choroby. Strąki równomiernie dojrzewają, co powoduje, że są łatwe do wymłócenia.



Typ / Odmiana	Kolor			Wczesność / Długość okresu wegetacji (dni)	Przydatność			Uwagi
	Strąk	Długość (cm)	Szerokość (cm)		Bezpo- średnie spotykanie	Kon- serwo- wanie	Mro- żenie	
SZPARAGOWA KARŁOWA								
Berggold	żółty	12-13	0,9	wczesna (60-65)	**	**	**	
Bis	żółty	16-17	1,5-2	wczesna (65)	**	*	*	typ Mamut
Elektra	żółty	12-15	0,8-0,9	wczesna (63-65)	**	**	**	Polecana do przyspieszonej uprawy w tunelach i w polu pod agrowłókną.
Goldpantera	żółty	12-15	0,8-0,9	wczesna (65)	**	*	*	
Goliatka	żółty	15-18	1,8-2,2	średniowczesna (70-75)	**			typ Mamut
Korona	żółty	10-11	0,8-0,9	wczesna (63)	**	*	*	Polecana do przyspieszonej uprawy w tunelach.
Laurina	żółty	11-13	0,8	wczesna (72)	**	*	*	
Maxidor	żółty	14-15	0,8-1	wczesna (63-65)	**	**	**	Odmiana odporna na antraknozę i bakteriozę.
Supernano giallo	żółty	12-14	1,2-1,5	średniowczesna (75)	**			typ Mamut
Undira	żółty	13-14	0,8-0,9	średniowczesna (70-75)	**	**	**	
Złota Saxe 	żółty	11-12	0,8-0,9	bardzo wczesna (60)	**	*	**	Polecana do przyspieszonej uprawy w tunelach i pod agrowłókną.
Casablanca	zielony	12-13	0,8-0,9	średniowczesna (75)	**	**	**	
Ibiza	zielony	10-11	0,5-0,6	wczesna (65)	**	**	**	Odmiana odporna na antraknozę i bakteriozę.
Jagunia 	zielony	12-14	0,8-1	średniowczesna (70)	**	**	*	Polecana również na suche nasiona. Nasiona bordowo-fioletowe.
Majorka	zielony	13-14	0,8-0,9	średniopóźna (80)	**	**	**	
Processor	zielony	14-15	0,8-1,1	średniowczesna (70-75)	**	**	**	
Urania	zielony	14-15	0,8-0,9	średniowczesna (65-70)	**	**	**	
Purple Teepee	fioletowy	12-13	0,8-0,9	średniowczesna (65-70)	**			Po ugotowaniu strąki robią się zielone.
Borlotto lingua di fuoco nano	dwubarwny, kremowo-czerwony	12-13	1,5-2	średniowczesna (70-75)	**	*		Również na suche nasiona.
SZPARAGOWA TYCZNA								
Blaueilde	fioletowy	18-20	1,2-1,5	wczesna (65-70)	**			Strąki po ugotowaniu robią się zielone.
Goldmarie	żółty	18-20	2-2,5	wczesna (60-65)	**	*	*	typ Mamut
Hids Neckarkoenigin	zielony	18-20	1,2-1,5	wczesna (60-65)	**	*		

* dobra ** bardzo dobra

Typ / Odmiana	Wczesność	Wysokość roślin (cm)	Nasiona (kształt, kolor)	Masa tysiąca nasion (g)
KARŁOWA NA SUCHIE NASIONA				
Aura	wczesna	45-50	duże owalne (na przekroju), białe, błyszczące, lekko żyłkowe	440-500 g
Igołomska	wczesna	35-50	cyldryczno-wydłużone, białe, delikatnie żyłkowe	350-400 g
WIELKOKWIATOWA				
Eureka	wczesna	45-50	owalne, białe, typ „Jaś karłowy”	950-1000 g
Kontra	średniowczesna	45-50	wydłużone, lekko spłaszczone, białe, błyszczące, żyłkowe, typ „Jaś karłowy”	1200-1400 g
Piękny Jaś	późna	250-300 (tyczna)	nerkowate, lekko spłaszczone, bardzo duże, białe z gładką skórą	1500-1800 g



warzywa kapustne



kapusta

Do warzyw kapustnych zalicza się 10 roślin z rodziny krzyżowych: kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, jarmuż, kapusta pekińska, brokuł, brukselka, kalarepa, kalafior i kapusta chińska. Warzywa kapustne nie mają wysokich wymagań cieplnych – optymalna temperatura do wzrostu wynosi 15-20°C. Są odporne na niskie temperatury – znoszą krótkotrwałe spadki temperatury poniżej 0°C. Jednak kapustne mają bardzo duże wymagania co do ilości światła. Niedobór światła powoduje „wybieganie” roślin, czyli nadmierne wydłużanie się części nadziemnej oraz utratę intensywnie zielonej barwy. Natomiast nadmiar światła i wysoka temperatura w okresie wykształcania się róż kalafiora, powodują ich żółknięcie. Rośliny mają duże wymagania pokarmowe i wodne, wymagają gleb żwizkich o pH 6,2-7,0.



Typ / Odmiana	Wczesność	Ilość dni od posadzenia do zbioru	Głowa				Przydatność			Uwagi
			Kształt	Kolor	Masa (kg)	Twardość	Bezpośred. spożycie	Przetw. stwo	Przechowywanie	
KAPUSTA BIAŁA										
Amager Polana	późna	135-140	kulisty	ciemnozielony	2,8-3,5	bardzo duża	••	•••	•••	Odmiana przeznaczona do polowej uprawy. Polecana na przechowywanie.
Dittmarska Najwcześniejsza	wczesna	50-55	kulisty	jasnozielony	1-1,5	średnia	•••			Do uprawy pod folią, agrowłókniną i w polu.
Golden Acre	bardzo wczesna	50-55	kulisty	jasnozielony	1-1,5	średnia	•••			Posiada wysokie wymagania pod względem żyzności gleby i nawadniania.
Komietna Głowa	późna	140-160	kulisty	szerokozielony	3,5-4	bardzo duża	•••	•••	••	Odmiana bardzo pełna, doskonała do kiszenia.
Langedijker Dauer	bardzo późna	150-160	kulisty	zielony	3-5	bardzo duża	••	•••	•••	Odmiana polecana do długiego przechowywania.
Polar	późna	140-150	kulisty	zielony	3-4	duża	••	•••	•••	Odmiana polecana do długiego przechowywania.
Sława z Gołębiewa	średnio-wczesna	75-85	kulisty, lekko spłaszczony	jasnozielony	3-4	średnia	•••	•••		Do wczesnego kiszenia na użytek północnej i jesienny.
KAPUSTA CZERWONA										
Haco	średnio-wczesna	100-110	kulisty	czerwono-fioletowy	1-1,5	duża	•••	•	•	Polecana na świeży rynek, doskonała na surowki.
Kalibos	średnio-późna	105-120	stożkowy	purpurowo-fioletowy	1,5-2	średnia	•••	•		Niezwykle smaczna odmiana, doskonała na surowki.
Langedijker Dauer 2	bardzo późna	150-160	kulisty	ciemnoczerw.-fioletowy	2-2,5	bardzo duża	••	•	•••	Polecana na salatek, surowki, a także do kiszenia.
Rufus	średnio-wczesna	95-105	kulisty	ciemnoczerw.-fioletowy	1,3-2	duża	•••	••	•	Ma zdrowe, niskokaloryczne soki i surowki.
KAPUSTA WŁOSKA										
Aubervilliers	średnio-wczesna	70-75	kulisty	zielony	1,5 – 2	średnia	•••	•		Odmiana odporna na niekorzystne warunki klimatyczne, doskonała do gotówek.
Vertus 2	średnio-późna	120-130	kulisty lekko spłaszczony	zielony	2-2,5	średnia	•••	•	•	Bardzo pełna odmiana, wytwarza silnie pęcherzykowate liście.

• przydatna

•• polecana

••• przeznaczona



kapusta brukselska





jarmuż



kalarępa



Anethum graveolens - roślina pochodząca z Azji. Obecnie uprawiana na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy. Jednak w formie dzikiej już nie występuje. Roślina łatwa w uprawie o niewielkich wymaganiach. W Polsce ma wiele nazw regionalnych: kajzer, koper swojski, koper wonny, kopr, koper polski, koper pospolity czy krop. Dawniej uważany za roślinę czarodziejską chroniącą przed piorunami i złymi snami, a jego wiązki wieszano w domach dla ochrony. Dziś powszechnie używany w kuchni.

Ambrozja



Odmiana o dużej zawartości olejów eterycznych i intensywnym zielonym wybarwieniu. Dzięki dużej liczbie bocznych rozgałęzień daje wysoki plon masy zielonej. Odmiana przydatna zarówno do zbioru „na zielono”, jak również do suszenia i mrożenia.



koper

Odmiana	Zbiór „na zielono” (wiosna/łt)	Wczesność kwitnienia	Użytki		Uwagi
			Kolor	Intensywność smaku	
Ambrozja	45-50	wczesna	intensywnie zielony	bardzo dobra	Wysoki plon zielonej masy. Odmiana bardzo aromatyczna. Polecany do zbioru na zielono, na susz i do mrożenia.
Lukullus	45-50	wczesna	zielony	dobra	Polecany do przetworstwa, do suszenia i spożycia na świeżo. Doskonali na bułdady.
Monarch	45-50	średniopóźna	ciemnozielony	bardzo dobra	Odmiana o intensywnym aromacie, silnie krzewiąca. Doskonale odrasta po cięciu, które można przeprowadzić trzykrotnie.
Moravan	50-55	średniopóźna	ciemnozielony	bardzo dobra	Bardzo pełna i niezwykle aromatyczna odmiana, głównie do zbioru „na zielono”. Późno wybija w pędy nasienne.
Ogrodowy	45-50	średniopóźna	zielony	bardzo dobra	Odmiana przeznaczona do zbioru „na zielono”, do suszenia i mrożenia.
Sprinter	50-55	średniopóźna	ciemnozielony	bardzo dobra	Odmiana tolerancyjna na okresowe braki wody, polecana do bezpośredniego spożycia i na mrożenie, kiszenie oraz susz. Daje wysoki plon zielonej masy.
Szmaragd	45-50	średniopóźna	zielony, ze średnim natężeniem woń	bardzo dobra	Odmiana bardzo pełna zarówno w uprawie „na zielono”, jak i do kiszenia.

m a r c h w i e

Pochodzi z okolic dzisiejszego Afganistanu, gdzie była uprawiana już 4 tys. lat temu. Pierwotnie miała kolor fioletowy i gorzki smak. W I wieku pojawiły się czerwone formy marchwi, a do XII wieku żółta i biała. Natomiast pomarańczowe marchewki pojawiły się dopiero w XVII wieku, najprawdopodobniej dzięki Holendrom. W dzisiejszych czasach uprawiana na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Dzięki dużej zawartości beta-karotenu, witaminy K i B6 ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie wzroku. W Europie i Azji jest ważnym składnikiem sałatek, dań jednogarnkowych, bulionów, zup i ciast. Spożywana w nadmiarze powoduje przebarwienie skóry.

Amsterdam 3
-Amsterdamska

Odmiana wczesna i plenna. **Polecana na zbiór pęczkowy.** Doskonała na surówki, soki i na sucho. Charakteryzuje się korzeniem tępo zakończonym o miększu ciemnopomarańczowym, kruchym i bardzo smacznym.

Berlikumer 2
-Perfekcja

Odmiana późna, bardzo plenna o miększu bardzo smacznym i soczystym. Doskonała do przechowywania oraz przetwórstwa.

Flakkese 2
-Flacoro TOR

Odmiana późna i bardzo plenna. Polecana do bezpośredniego spożycia oraz do przetwórstwa i przechowywania. Dzięki niewielkiej skłonności do pęknięcia nadaje się do zbioru mechanicznego.



typ Amsterdam



typ Berlikumer



typ Chantenay



typ Flakkee



typ Nantes



typ Parmex

Odmiana	Wzrost, okres wegetacji (dni)	Typ	Korzeń		Przydatność			Uwagi
			Długość (cm)	Kształt	Świeży rynek	Przetwórstwo	Przechowywanie	
Amsterdam 3 - Amsterdamka TOR	wczesna (100)	A	12-15	walcowaty	***			Doskonała do uprawy pęczkowej. Uprawa w polu i pod osłoną.
Berlikumer 2 - Perfekcja TOR	późna (150)	B	16-19	stożkowy zaokrąglony	***	**	***	Doskonała do przechowywania.
Chantenay	wczesna (100)	Ch	11-12	gruby stołek	***	**		Szybkie tempo wzrostu.
Cidera	późna (145-155)	N	21-23	walcowaty stołek zaokrąglony	***	***	***	Doskonała na soli i do konserwowania. Polecana na zbiór mechaniczny. Nie kumuluje azotanów.
Dolanka	późna (160)	F	17-24	stożkowy	***	***	***	Daje bardzo wysoki plon.
Flakkese 2	późna (150-160)	F	20-25	stożkowy	***	***	***	Zalecana uprawa na redinach.
Flakkese 2 - Flacoro TOR	późna (150-160)	F	18-24	stożkowy	***	***	***	Zalecana uprawa na redinach.
Karotina	średniopóźna (125-130)	N	18-20	walcowaty stołek zaokrąglony	**	***	*	Wysoka zawartość karotenu.
Katrin	średniowczesna (125-130)	Ch	11-13	gruby stołek	***	***		Szybkie tempo wzrostu.
Korał	późna (140-150)	F	18-20	stożkowy lekko zaokrąglony	***	***	***	Polecana na zbiór mechaniczny.
Nantes 2	średniowczesna (100-115)	N	15-16	walcowaty stołek zaokrąglony	***	*		Z późnego siewu nadaje się do przechowywania.
Nantejska Polana	średniowczesna (115-120)	N	15-18	walcowaty stołek zaokrąglony	***	*		Z późnego siewu nadaje się do przechowywania.
Parlisse Markt 4	bardzo wczesna (70-80)	P	4-5	okrągły	***	***		
Regulika	późna (140)	N	12-19	walcowaty stołek zaokrąglony	***	***	***	Doskonała na przetwórstwo. Nie kumuluje azotanów.
Sukces	późna (150)	F/B	20-24	lekki stołek zaokrąglony	***	**	***	Daje bardzo wysoki plon. Wysoka zawartość karotenu.
Touchon	średniowczesna (115-120)	N	16-20	walcowaty	***	**		Szybkie tempo wzrostu.

Typ: A – Amsterdam B – Berlikumer Ch – Chantenay F – Flakkee N – Nantes P – Parmex * – przydatna ** – polecana *** – przeznaczona

pietruszki



Halblange -Berlińska



Odmiana późna, bardzo płenna - powyżej 30 t/ha.
Korzeń kształtu wydłużonego stożka o długości ok. 20 cm.
Kora biała, wałec osiowy kremowobiały, miąższ jędrny i smaczny.
Odmiana przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
bardzo dobrze znosi przechowywanie, polecana również
do przetwórstwa. **Może zimować w polu.**



pietruszka

Odmiana	Wczesność	Długość korzenia (cm)	Przydatność			Zimowanie w polu	Uwagi
			Świeży rynek	Przetwórstwo	Przechowywanie		
Alba	średniopóźna	15-18	***	***	***	*	Wskazana uprawa na redlinach, duża odporność na choroby przechowalnicze.
Cukrowa	wczesna	12-15	***	*			Głównie do bezpośredniego spożycia. Doskonała na wczesny zbiór pęczkowy.
Halblange - Berlińska TOR	późna	18-20	***	***	***	***	Odmiana płenna, bardzo aromatyczna. Wskazana uprawa na redlinach. Można wysiewać późną jesienią pod tzw. „grudę”.
Konika	średniowczesna	12-15	***	***	*		Odmiana przeznaczona głównie na gleby ciężkie.
Olomuńska	późna	22-25	***	***	***	*	Odporna na suszę i zmienne warunki atmosferyczne, zalecana uprawa na redlinach. Można wysiewać późną jesienią pod tzw. „grudę”.
Osborne	średniopóźna	22-25	***	***	***		Dobrze znosi okresowe niedobory wody. Zalecana uprawa na redlinach.

* przydatna ** polecana *** przeznaczona

Ogórek - choć należący do dyniowatych to wymaga jednak szczególnego potraktowania. Co by się stało gdyby nie było ogórka? Na pewno wiele sałatek stałoby się mniej aromatycznych i smacznych, a podkrążone oczy straciłyby swojego wybaczcę. Ze względu na dużą zawartość wody jest jej doskonałym regulatorem w organizmie. W kosmetyce wykorzystywany jako komponent do wielu maseczek i toników. Ogórek zawiera m.in. *kukurbitacynę* - substancję hamującą rozprzestrzenianie się komórek rakowych. Warzywo (choć w Iranie uznawane za owoc) w uprawie bardzo pozytywnie reaguje na dużą ilość substancji organicznej i spulchnianie.

o g ó r k i

Edyp F1



Odmiana średniowczesna przeznaczona do uprawy polowej. Rośliny tej odmiany cechuje silny wigor oraz występowanie prawie wyłącznie kwiatów żeńskich. Polecana na korniszony, do konserwowania i kwaszenia. Owoce bardzo kształtne, białokolcowe, z lekkim połyskiem, bez tendencji do zniekształceń oraz przerastania na grubość (bez tendencji do beczułkowatości), bardzo smaczne i chrupkie. W ocenie polowej odmiana ta wyróżnia się kompleksową odpornością na choroby (parch dyniowatych, mączniak prawdziwy, wirus mozaiki ogórka) oraz wysoką tolerancją wobec mączniaka rzekomego. Polecana do uprawy ekologicznej i integrowanej zarówno dla działkowców, jak i producentów towarowych.



Ibis F1



Heterozyjna, bardzo wczesna odmiana ogórka polowego, której siewki mają duży wigor objawiający się zdolnością do regeneracji po wystąpieniu chłódów. Bardzo plenna, stabilna w plonowaniu i tolerancyjna na deficyt wody. Rośliny tego mieszańca cechuje wyjątkowa kondycja, co zapewnia długi okres wegetacji, a to pozwala na przedłużenie zbiorów do jesieni. Wytwarza prawie wyłącznie kwiaty żeńskie od jednego do trzech w węźle. Skórka zielona do ciemnozielonej, brodawki średniej grubości i mało liczne, kolce białe. Owoce średniej długości, tępo zakończone przy nasadzie, nie przerastają na grubość i posiadają małą do średniej komorę nasienną z niewielką ilością nasion. Owoce bardzo smaczne, chrupkie bez goryczy. Polecane do konserwowania i kwaszenia. Odmiana posiada kompleksową polową odporność na choroby (parch dyniowatych, wirus mozaiki ogórka, mączniak prawdziwy oraz jest wysoko tolerancyjny na mączniaka rzekomego).

Polecana do uprawy integrowanej z ograniczoną ochroną chemiczną.



Odmiana	Wczesność	Użytko- wanie	Tolerancja wobec mączniaka	Uprawa	Uwagi
Aladyn F1	średnio- wczesny	Ko	T	P	Owoc kształtny, krótki, zielony z jasnymi smugami i małymi brodawkami.
Altaj F1	wczesny	Ko	T	P	Odmiana pozbawiona goryczy, bez tendencji do przerastania (3,3:1), jasnozielony.
Anulka F1	średnio- wczesny	Kn	T	P	Wskazany codzienny zbiór owoców na komiszony. Owoc krótki.
Bonus F1	średnio- wczesny	Kw, Ko, Ms	T	P	Nie tworzy pustych komórek nasiennych. Owoc zielony z lekкими smugami.
Carosello Barese	średnio- wczesny	S		P, F	Ogórek melonowy. Jasnozielone, zebrańne długie owoce.
Cezar F1	średnio- wczesny	Ko, Kw	T	P	Smukłe owoce, pokryte grubymi brodawkami, nie wykazują tendencji do tworzenia pustych przestrzeni nasiennych.
Corveta F1	wczesny	Ko, Kw	T	P	Owoc ciemnozielony, bez goryczki z grubymi, białymi brodawkami. Nie przerastający na grubość (3,6:1).
Dalia F1	średnio- wczesny	Ko, Kw	TT	P	Odmiana czarnokółkowa, typ Polan. Owoc nie przerasta na grubość (3,3:1).
Dar	średnio- wczesny	S, Ko	T	P, D	Odmiana o krzaczastym pokroju i nieprzerastających owocach.
Delikatess	średnio- wczesny	S	T	P	Owoce duże, pokryte delikatną skórą z niewielkimi, gładkimi brodawkami. Mała komora nasenna.
Edyp F1	średnio- wczesny	Ko, Kw, Kn	TT	P	Owoc kształtny, bez tendencji do znieskształceń i do przerastania na grubość. Doskonale na kwaszenie.
Fason F1	średnio- późny	Ko	T	P, F	Owoc drobnobrodkowy.
Gracius Gładki F1	średnio- wczesny	S, Mr	T	P, F	Owoc gładki, odmiana partenokarpiczna. Mała komora nasenna.
Ibilo F1	bardzo wczesny	Ko, Kw, Kn	TT	P	Owoce średniej długości, bez goryczki z małą komorą nasenną. Jedyna odmiana tolerująca wschody w niskich temperaturach.
Julian F1	średnio- wczesny	Kw, Ko, Ms	TT	P	Nie wykazuje tendencji do wytwarzania pustych przestrzeni nasiennych.
Krak F1	średnio- wczesny	Ko, Kw	T	P	Owoc kształtny, cylindryczny i regularny w formie. Zielony z jasnymi smugami.
Monika	bardzo wczesny	Ms, Ko, S		P, F	Odmiana partenokarpiczna, do przyspieszonej uprawy.
Octopus F1	średnio- wczesny	En, Ko	TT	P	Odmiana pełna, grubobrodawkowa.
Polan F1	średnio- wczesny	Ko, Kw		P	Odmiana czarnokółkowa.
Soplica F1	średnio- wczesny	Ko, Kw	TT	P	Owoc długi i smukły, skórka intensywnie zielona z jaśniejszymi smugami i niewielkimi brodawkami, zbiór nawet do późnej jesieni. Bez tendencji do przerastania na grubość. Silny vigor.
Śremski F1	wczesny	Ko, Kw		P	Owoc jasny. Brodawkę z białymi kolcami.
Tessa F1	średnio- wczesny	S, Mr	TT	P, F	Owoc o gładkiej ciemnozielonej skórce i małej komorze nasennej.
Vert petit de Paris	wczesny	Kn, Ko, Kw	T	P	Odmiana bardzo pełna, partenokarpiczna. Owoc bez tendencji do żółknięcia, doskonały na komiszony.
Victoria F1	wczesny	Ko		P, F	Owoc drobnobrodkowy. Nadaje się do jesiennej uprawy pod osłonami.
White Wonder	średnio- wczesny	S, Ko, Kw		P, D	Owoc o białej skórce. Dobrze się komponuje w sałatkach.

T - wysoka
Ko - konserwowy
F - uprawa pod folią

TT - bardzo wysoka
Kw - kwaszeniak
P - uprawa w polu

Kn - komiszony
Mr - mrożonki
D - uprawa w doniczkach

Ms - małosolne
S - sałatki





ogórek pod osłoną

Odmiana	Owoc		Typ wzrostu	Uprawa
	Długość (cm)	Powierzchnia		
Atos F1	25-30	lekko żebrowana	normalny	S, TO - wczesna wiosna
Dukat F1	32-35	lekko żebrowana	silny	S, TN - wiosna, jesień
Ines F1	18-20	gładka	silny	S, TN - wiosna, jesień
Lawina F1	18-20	gładka	normalny	S, TO - wiosna
Lech F1	25-30	lekko żebrowana	normalny	S, TO - wiosna, jesień
Topaz F1	40-45	żebrowana	silny	S - wczesna wiosna
Saladin F1	30-35	gładka	silny	S, TO - wiosna

S - szklarnia TO - tunel ogrzewany TN - tunel nieogrzewany

„wyszukane
i ciekawe”



papryki

Kariera papryki w Europie rozpoczęła się w okresie Krzysztofa Kolumba, który sprowadził ją do Hiszpanii na przełomie XIV i XV wieku. Roślina klimatu ciepłego stąd wysokie wymagania termiczne i świetlne. Dzisiaj uprawiana w szklarniach, tunelach ale również w gruncie. Warzywo o różnych kształtach i kolorach, a co najważniejsze o różnym smaku warunkowanym zawartością kapsaicyny, która odpowiada za jej ostrość. W 1912 roku wprowadzono specjalną skalę dla określenia ostrości, to skala Scoville'a. Papryka jest szeroko wykorzystywana w kuchni do różnego rodzaju sałatek, przetworów, ale także do nadziewania, pieczenia i duszenia. W uprawie celem zwiększenia plenności owoców należy pamiętać o usunięciu pierwszego kwiatu w rozgałęzieniu łodygowym.





papryka

Odmiana	Miejsce uprawy	Wczesność	Owoc				Uwagi
			Masa owocu (g)	Grubość ścianki (mm)	Kolor	Kształt	
SŁODKA							
Alfocita	S, TN	średniopóźna	200	8-10	żółty	typ blok	Duże owoce o smacznym i grubym miąższu.
Aleksander	S, TN, P	wczesna	80-90	8-10	ciemnoczerwony	typ pomidorowy	Bardzo pełna o grubym miąższu.
Balladyna	S, TN, P	średniowczesna	160-190	6-8	czerwony	typ blok	Duże owoce o smacznym miąższu.
California Wonder	S, TN	średniowczesna	160-190	6-7	ciemnoczerwony	typ blok	Duże, smaczne owoce.
Dumas	S, TN	średniowczesna	90	8-10	ciemnoczerwony	typ pomidorowy	Gruba ścianka, bardzo pełna.
Iga	S, TN, P	średniowczesna	130-150	9-12	czerwony	typ pomidorowy	Bardzo gruby miąższ.
Ingrid	SO, TO, S, TN	średniopóźna	200	8-10	brązowożółty	typ blok	Duże owoce o grubych ściankach.
Monanta	S, TN, P	bardzo wczesna	150-160	6-8	żółty / czerwony	stożkowaty	Słodkie i smaczne owoce na początku żółte, później czerwone.
Poupila	P	wczesna	ok. 10		żółty / czerwony	stożkowaty	Odmiana również nadająca się do uprawy w doniczkach i na balkonach. Owoce małe i bardzo smaczne.
PÓŁOSTRA							
Rokita	S, TN, P	wczesna	25-45	3-4	ciemnoczerwony	stożkowaty	Polecana do konserwowania i suszenia.
OSTRA							
De Cayenne	P	wczesna	25-30	2-3	czerwony	stożkowaty	Polecana do konserwowania i suszenia.
Koral	P	średniowczesna	8-10		czerwony	okrągły	Odmiana również nadająca się do uprawy w doniczkach i na balkonach. Polecana do suszenia.

p o m i d o r y

Do Europy sprowadzone przez Hiszpanów jako „peruwiańskie jabłka” lub „jabłka miłości”. Do Polski trafiły dzięki królowej Bonie. Nazwę przyjęto od włoskiego „pomme d’or”, czyli „złote jabłko”. Dzisiaj chętnie używane są w wielu salatkach. Są też głównym składnikiem przecierów i ketchupów. Roślina o sporych wymaganiach pokarmowych i świetlnych. Właśnie dlatego powinna być uprawiana na nasłonecznionych i dobrych glebach. Popularność tej rośliny spowodowała wielokierunkowy rozwój jej hodowli. Obecnie na rynku dostępne są odmiany różniące się kształtem, kolorem i wielkością owoców.



Bawole serce



Odmiana do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi i w polu. Wymaga prowadzenia przy palikach. Owoce bardzo duże nawet do 500 g, mięsiste o barwie malinowej i sercowatym kształcie.

Malinowy Kujawski



Odmiana średniowczesna do uprawy w polu oraz pod niskie osłony. Doskonała dla przetwórstwa. Roślina samokończąca, nie wymagająca cięcia i palikowania. Owoce kuliste, malinowe, o wyjątkowo intensywnej barwie miąższu. Odmiana tolerancyjna na choroby grzybowe i bakteryjne. **Polecana do uprawy ekologicznej.**



Malinowy Rodeo



Odmiana wielkoowocowa, z przeznaczeniem na świeży rynek. Roślina samokończąca. Owoce malinowe, bez piętki, duże i bardzo duże (500-650 g), średnio twarde o słabym żebrzowaniu przy szypułce. Odmiana do uprawy w polu bez podpór lub pod niską folią. **Cecha wyróżniająca: owoc w typie Bawole Serce na niskiej roślinie.**



Zorza Toruńska



Najwcześniejsza odmiana pomidora malinowego przeznaczona do uprawy pod osłonami i w tunelu. Wymaga prowadzenia przy palikach. Owoce o barwie malinowej, kulistosplaszczonym kształcie i wyraźnym żebrzowaniu oraz średniej masie 150-200 g.





Odmiana średniowczesna do uprawy w polu. Dostojna do przetwórstwa (soki, ketchup, przeciery), samokńcząca, przeznaczona także do bezpośredniego spożycia. Owoc wydłużony, średniej wielkości, mięsisty, twardy o intensywnie czerwonej barwie miąższu oraz wysokiej zawartości suchej masy i witaminy C. W transporcie odporny na uszkodzenia i pęknięcie.

Tolek



Odmiana średniowczesna do uprawy pod osłonami i w polu, przeznaczona głównie na świeży rynek i do przetwórstwa (przeciery, soki). Wymaga prowadzenia przy palikach. Duże, mięsiste owoce (ok. 300-400 g), intensywnie czerwone o kulistym kształcie, lekko spłaszczonym i gładkiej powierzchni.

Można obierać bez parzenia owocu!



Jantar



Odmiana wczesna, wielkoowocowa, do uprawy w tunelu foliowym przy podperkach. Owoc barwy żółtopomarańczowej, bardzo duży (300-450 g), lekko spłaszczony, średnio twardy, bardzo mięsisty o niepowtarzalnym smaku i aromacie.

Odmiana amatorska, przeznaczona głównie do bezpośredniego spożycia.

Możliwa jest również uprawa w polu przy palikach.

pomidory koktajlowe



Malinowy Kapturek



Odmiana drobnoowocowa, samokończąca. Owoc mały (7-9 g), cylindryczny, o wyjątkowym smaku, barwy różowomalinowej, trwały, bez skłonności do opadania. Grona dł. ok. 45-75 cm, najczęściej złożone. Liczba owoców na roślinie ok. 450-600. Rośliny dobrze reagują na podwiązanie gron. Zaleca się je z uwagi na dużą ilość owoców. Odmiana do uprawy w tunelu foliowym przy podporach oraz w polu w miejscach osłoniętych i na balkonie. Nadaje się do uprawy ekologicznej. **Cechy wyróżniające: odmiana pomidora typu „cherry” o malinowych owocach i bardzo wysokiej odporności na choroby grzybowe.**

Cytrynek Groniasty

Odmiana drobnoowocowa, wczesna o ciągłym typie wzrostu, przeznaczona do uprawy w nieogrzewanych tunelach, w polu przy palikach oraz na balkonie. Grona nierozgałęzione długości 60-70 cm. W gronie do 65 szt. bardzo smacznych, żółtocytrynowych owoców o średniej masie do 15 g. **Odmiana bardzo odporna na choroby grzybowe, polecana do uprawy ekologicznej.**



Malinowy Smaczek

Stosunkowo wczesna odmiana drobnoowocowa, do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi lub w polu w miejscach osłoniętych i na balkonie. Wymaga cięcia i prowadzenia przy podporach. Owoce malinowe typu „cherry” (masa 7-10 g), wyjątkowo trwałe, zebrane w złożone grona. Z jednej rośliny możemy uzyskać 150-200 szt. wydłużonych, orzeźwiających owoców o wyjątkowo małej skłonności do pęknięcia i pełnym pomidorowym smaku. **Odmiana tolerancyjna na choroby grzybowe i bakteryjne. Polecana do uprawy ekologicznej.**



Odmiana	Typ wzrostu rośliny	Miejsce uprawy	Wzrost	Owoc			Przydatność	Uwagi
				Masa [g]	Kolor	Kształt		
Bajaja	sztywno-lodowy	R, P	bardzo wczesny	8-10	czerwony	kulisty	odmiana amatorska, dekoracyjna	Do uprawy w doniczkach. Odporny na choroby grzybowe, trwały owoc.
Bawole Serce	wysoki	T, P	średnio-późny	350-500	malinowy	sercowaty	bezpośrednie spożycie i przetwory	Bardzo duży owoc o wyjątkowym smaku.
Bekas F1	wysoki	S, T, P	wczesny	70-125	czerwony	kulisto-splaszczony	uniwersalna pod względem miejsca uprawy	Prowadzić na 8-5 gron.
Betalux	niski, sztywno-lodowy	P	bardzo wczesny	50-60	czerwony	kulisto-splaszczony	przetwórstwo, bezpośrednie spożycie	Odmiana o niskim wzroście.
Black Cherry	wysoki	T, P	średnio-wczesny	15-20	ciemno-wiśniowy	kulisty	bezpośrednie spożycie	Owoc koktajlowy, bardzo smaczny, słodki.
Bruno F1	wysoki	T, P	wczesny	160-180	czerwony	kulisto-splaszczony	wysoki plon i łatwa uprawa	Twardy i jędrny owoc, o smacznym, zbitym miąższu.
Brutus	wysoki	T, P	średnio-późny	500-2000	czerwony	kulisto-splaszczony, żółtobrowny	bezpośrednie spożycie i przetwory	Owoce duże. Roślina silnie rosnąca, wymaga podparcia.
Cytrynek Groniasty	wysoki	T, P, B	wczesny	12-15	żółty	kulisto-wyflakony	odmiana amatorska, odporna na choroby grzybowe	Owoce koktajlowe bardzo smaczne. Do 65 szt. owoców w gronie.
Dafne F1	wysoki	S, T, P	średnio-wczesny	125-140	czerwony	kulisto-splaszczony, lekko żółtobrowny	do bezpośredniego spożycia oraz przetwórstwa	Owoce odporne na pęknięcie.
Hardy F1	wysoki	S, T, P	średnio-późny	170-190	czerwony	okrągły, lekko splaszcz.	bezpośrednie spożycie i przetwory	Owoce bardzo trwałe i odporne na pęknięcie.
Jantar	wysoki	T, P	wczesny	300-450	żółto-pomarańcz.	kulisto-splaszczony	bezpośrednie spożycie	Owoc bardzo mięśisty, bardzo smaczny.
Krakus	wysoki	P, T	średnio-późny	80-90	ciemno-czerwony	kulisty	odmiana amatorska	Doskonały na domowe przetwory i sałatki.
Malinowy Kapturek	wysoki, smolokształny	T, P, B	bardzo wczesny	7-9	czerwono-malinowy	wyflakony	bardzo smaczna odmiana amatorska	Owoce koktajlowe, 450-500 owoców na rośnię. Odporna na choroby grzybowe.
Malinowy Kujawski	niski, sztywno-lodowy	T, P	średnio-wczesny	70-90	malinowy	kulisty	przetwórstwo, bezpośrednie spożycie, doskonały na soki	Odporny na choroby grzybowe i bakteryjne.
Malinowy Rodeo	niski, wiotko-lodowy	T, P	średnio-wczesny	500-650	malinowy	sercowaty typ "bawole serce" bez plątki	bezpośrednie spożycie, soki	Owoc bardzo mięśisty.
Malinowy Smaczek	wysoki, silnie rosnący	T, P, B	wczesny	7-10	malinowy	wyflakony	odmiana polecana do uprawy ekologicznej	Odmiana koktajlowa, odporna na choroby grzybowe i bakteryjne.
Noire de Crimée	wysoki	T, P	wczesny	300-400	czerwono-czarny	kulisto-splaszczony	bezpośrednie spożycie, soki	Aromatyczny owoc, o słodko-pikantnym smaku. Oryginalny wygląd.
Orkado F1	wysoki	T, P	średnio-wczesny	130-145	czerwony	kulisto-splaszczony	bezpośrednie spożycie, soki, przetwory	Owoc odporny na pęknięcie.
Pelikan F1	wysoki	S, T, P	wczesny	80-120	czerwony	kulisto-splaszczony	bezpośrednie spożycie, przetwory	Prowadzenie na jeden - dwa pędy i podwiązanie gron.
Perkoz F1	wysoki	S, T, P	wczesny	140-160	czerwony	kulisto-splaszczony	bezpośrednie spożycie	Prowadzić na 9-13 gron.
Poranek	wiotko-lodowy	P	średnio-wczesny	70-100	czerwony	kulisty	przetwórstwo, bezpośrednie spożycie	Bardzo plenny. Toleruje ryzyko temperatury. Możliwy wysiew wprost do gruntu.
Remit F1	wysoki	S, T, P	wczesny	80-100	czerwony	kulisto-splaszczony	bezpośrednie spożycie	Roślina najlepiej owocuje prowadzona na 1-2 pędy.
Słonka F1	wysoki	S, T, P	średnio-wczesny	100-120	czerwony	kulisto-splaszcz., lekko jędr.	przetwórstwo, bezpośrednie spożycie	Odmiana o średniej sile wzrostu z gęsto rozmieszczonymi gronami.
Tolek	wysoki, wiotko-lodowy	T, P	średnio-wczesny	300-400	czerwony	kulisto-splaszczony	przetwórstwo, bezpośrednie spożycie	Słódkę owocu można zrehabilitować bez parzenia. Smaczny i mięśisty miąższ, intensywnie czerwony.
Tukan F1	wysoki	S, T	wczesny	75-130	czerwony	kulisto-splaszczony, lekko żółtobrow.	bezpośrednie spożycie, koncentraty, soki, sałatki i surówki	Owoc kształtny, z zanikającą plątką.
Złotawa	wysoki	T, P	średnio-wczesny	80-100	pomarańcz. o czerwonym miąższu	okrągły, sercowaty	bezpośrednie spożycie, soki, sałatki, surówki	Owoce bardzo smaczne i słodkie.
Zorza Toruńska	wysoki	T, P	bardzo wczesny	150-200	malinowy	kulisto-splaszczony, żółtobrowny	bezpośrednie spożycie i przetwory	Słodki miąższ, o małych gniazdach nasieniach. Najwcześniejsza z odmian pomidorów malinowych.
Zyska	niski, wiotko-lodowy	P	średnio-wczesny	60-80	czerwony	cyldryczny	bezpośrednie spożycie, przetwórstwo (przeciery, suszenie)	Owoc twardy, odporny na pęknięcie, o wysokiej zawartości suchej masy.

B - balkon P - pole S - szklarnia T - tunel nioogrzewany



rzodkiewki

Roślina pochodzi z Chin skąd trafiła do Europy, jako warzywo poprawiające bystrość umysłu i wspomagające trawienie. Dzisiaj dostępna w różnych kształtach i kolorach. Od okrągłych do cylindrycznych i od czerwonych poprzez żółte do białych. Można również spotkać odmiany o mięszu innego koloru niż biały. Roślina bardzo łatwa w uprawie i nie wymagająca nawożenia, ale lubiąca sąsiedztwo innych roślin dających cień. Z uwagi na fotoperiodyzm (wpływ długości dnia) zaleca się uprawę wczesną wiosną i jesienią.

Opolanka



Odmiana wczesna, o zgrubieniu cylindrycznym długości 4-5 cm i średniej wadze 8-9 g. Odznacza się smacznym mięszem, o małej skłonności do parzenia. W optymalnych warunkach uprawowych okres od siewu do zbioru wynosi około 27 dni.



Krasa



Odmiana wczesna, polecana do uprawy pod osłonami i w polu. Zgrubienia kuliste, jednobarwne, karminowoczerwone o średnicy 2,5-3 cm. Bardzo słaba skłonności do parzenia.





rzodkiewka

Odmiana	Zgrupowanie		Uprawa	
	Kształt	Kolor skórki	W polu	Pod osłonami
Afrodyta	kulisty	biały	wiosna, jesień	wiosna, jesień
Carmen	kulisty	karminowoczerwony	głównie wiosna, późna jesień	-
Carmesa	kulisty	różowoczerwony	wiosna, jesień	wiosna, jesień
Caro	kulisty	czerwono-biały	wiosna, jesień	wiosna, jesień
Cherry Belle	kulisty	czerwony	wiosna, jesień	wiosna, jesień
De dix-huit jours 18 dni	cyldryczny	czerwono-biały	wiosna, jesień	-
Fiesta	kulisty	karminowoczerwony	wiosna, jesień	wiosna, jesień
Krakowianka	kulisty	czerwono-biały	wiosna, jesień	wiosna
Krasa	kulisty, lekko spłaszczony	karminowoczerwony	wiosna, jesień	wiosna
Milla	cyldryczny	czerwono-biały	wiosna, jesień	wiosna, jesień
Opolanka	cyldryczny	szafratno-biały	wiosna, jesień	wiosna, jesień
Rowa	kulisty	czerwony	wiosna, jesień	wiosna, jesień
Saxa 3	kulisty	czerwony	wiosna, jesień	wiosna, jesień
Saxa Polana	kulisty	czerwony	wiosna, jesień	wiosna, jesień
Soplek Łodu	cyldrycznie wydłużony	biały	wiosna, jesień	-
Viola	kulisty	fioletowy	wiosna, jesień	-
Żłota	kulisty, lekko wydłużony	żółty	wiosna, jesień	-

rzodkiew



rzepa



Murzynka,
Runder Schwarzer Winter



s a ł a t y

Jak mówi prastare przysłowie sałata „Powinna techtać język nie paląc, odświeżać podniebienie nie drapiąc, pobudzać żołądek nie podrażniając go nadmiernie”. Już w starożytności babiloński książę Baltazar podawał na swoich ucztach sałaty pochodzące z wiszących ogrodów Semiramidy. Do Polski trafiła dzięki królowej Bonie. Jest rośliną klimatu umiarkowanego i najlepiej czuje się na terenach nadmorskich i podgórskich. Wrażliwa na niedobór światła w początkowym okresie uprawy. Mimo dość wysokich wymagań wodnych nie znosi zalewania, ponieważ powoduje to gnicie główek. Pod względem różnicowania kształtu i koloru jest jedną z najbardziej rozwijających się grup roślin.

Królowa Majowych



Odmiana masłowa. Polecana do wczesnej uprawy polowej. Wytwarza zwężone główki o średniej wielkości (ok. 250 g), charakterystycznie żółtozielono wybarwione. Wykazuje znaczną odporność na choroby.

Michalina



Odmiana masłowa, średniopóźna, polecana do wiosennej i letniej uprawy w polu. Wytwarza główki średnio zwarte, dość duże (ok. 350 g), jasnozielone o wysokich walorach smakowych.



Kumak



Salata głowiasta, krucha o dużych, średnio zwartych zamkniętych główkach i barwie zielonej do jasnozielonej. Liście średniej pęcherzykowatości. Struktura plonu należyta: jednoczesność tworzenia główek i mała skłonność do wybijania w pędy kwiatostanowe. Przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi oraz wczesnej uprawy w polu.





sałata



Odmiana	Miejsce uprawy	Uprawa					Główka			Uwagi
		Wczesno-wiosenna	Wiosenna	Létnia	Jesienna	Zimowa	Masa (kg)	Kolor	Zwężość	
GŁOWIASTA MASŁOWA										
Anielka	S				***	***	250	jasnozielony	średnia	
Atena	S				***	***	280	ciemnozielony	średnia	
Cud Voorburgu	P	***	***	*			300	jasnozielony	średnia	
Hamill	P	**				***	250	jasnozielony	średnia	Odmiana mrozoodporna do uprawy odcimowej, w rejonach o łagodnym klimacie. Wysiew: od połowy VIII do początku X.
Królowa Majowych 	P	***	**		*		250	żółtozielony z lekkim antocyjanowym przebarwieniem	duża	Wskazuje znaczną odporność na choroby
Michalina 	P		***	**			350	jasnozielony	średnia	Bardzo smaczne liście.
Mira	P, T	**	***	**			300-400	czerwono-zielony	duża	
Nochowska	P	**	***	**	**		250	jasnozielony	duża	
Rosemary	P	**	***		**		250	czerwono-zielony	mała	
Zina	P	**				***	250	jasnozielony	średnia	Odmiana zimująca w polu, w rejonach o łagodnym klimacie, wysiew jesienny k.VIII - k.IX.
GŁOWIASTA KRUCHA (ŁODOWA)										
Cermína	P	**	***	*	*		>1000	zielono-karminowy	duża	
Doree de Printemps	T, P	***	***				700	zielony	średnia	
Great Lakes 118	P	**	***	**			1000-1200	ciemnozielony	średnia	Odmiana późna.
Kamelot	P	**	***	**			1000	jasnozielony	średnia	Odmiana późna, typ Bataria.
Kinga	T, P	**	***	***	*		750-1200	zielony	duża	
Kurnak 	T, P	**	***	***	*		1000	jasnozielony - zielony	średnia	Bardzo smaczne kruche liście.
GŁOWIASTA LIŚCIOWA										
Dubacek	P		***	*	*		250-300	zielony		Bardzo smaczne, delikatne liście. Typ „dębiolistny”.
Lollo Bionda	T, P	***	***		**		250-300	zielony		Bardzo dekoracyjna rozeta.
Lollo Rossa	T, P	***	***		**		250-300	wiśniowo-czerwony		Bardzo dekoracyjna rozeta.
Redin	P	**	***	***	**		250-300	czerwony		Typ „dębiolistny”. Bardzo smaczne liście. Bardzo długo nie wybija w pędy nasienne.
Rusela	P	**	***	***	***		300-400	czerwony		Smaczne pofalowane liście. Dekoracyjna rozeta.
GŁOWIASTA ŁODYGOWA (GŁĄBIK)										
Purpurat	P		***	**			lodyga dł. 30-60 cm	czerwona z biało-zielonym mięszem		Część jadalna jest gruba, soczysta lodyga, przed rozwinieniem kwiatostanów. Do kiszenia, gotowania i na surowo.
RZYMSKA										
Livia	P	**	***	*			750-3000	zielony	mała	Długo nie wybija w pędy nasienne.

* przydatna ** polecana *** przeznaczona

W tej grupie chcielibyśmy przedstawić rośliny, których wspólnym wyróżnikiem jest to, iż głównie wykorzystywane są ich części liściaste. Przybliżamy mało znane warzywa o zróżnicowanych walorach smakowych oraz różnorodnych kształtach i kolorach.

warzywa liściaste



Mizuna

Inaczej Japońska musztarda to roślina jednoroczna łatwa w uprawie w okresie wiosennym i jesiennym. Preferuje chłodniejsze dni i wilgotne podłoże. Wytrzymuje przymrozki do -5°C . Część użytkową stanowią dekoracyjne liście, kwiaty oraz całe rośliny. Stanowi doskonały dodatek do sałatek, mięs i kanapek.



Portulaka warzywna

Roślina jednoroczna, płożąca. Nadaje się do uprawy w polu, pod osłonami, a także na balkonie. Częścią jadalną są kwaskowo-słone liście i końcówki pędów. Przyrządza się jak kalafior, szpinak lub szparagi. Na surowo poprawia smak sałatek i surówek.



Endyvia

Jednoroczna mieszanka różnych odmian różniących się formą, kolorem i kędzierzawością liści. Zawiera więcej potasu i biopierwiastków niż sałata. Charakteryzuje się lekko gorzkawym i orzechowym smakiem.



Roszponka

Łatwa w uprawie roślina na zbiór jesienny lub zimowo-wiosenny w polu i na balkonie. Jej kształtne, mięsiste i dobrze wybarwione liście (rozety) dobrze komponują się w sałatkach, koktajlach i jako dekoracja potraw. Jest niskokaloryczna i zawiera więcej witaminy C i beta-karotenu niż sałata.



Rukola

Łatwa w uprawie roślina jednoroczna lub wieloletnia (dzika). Pikantny smak liści doskonale komponuje się w mieszankach saładowych lub jako dodatek w innych potrawach.



s z p i n a k



Matador



Odmiana do uprawy wiosennej i jesiennej. Nie wykazuje skłonności do wybijania w pędy nasienne. Liście duże owalnie wydłużone, ciemnozielone i delikatnie karbowane. Szpinak zawiera spore ilości beta-karotenu, witaminy C, E i K, a także mikro i makroelementy (potas, magnez, wapń, fosfor, żelazo, cynk, miedź i mangan). Nadaje się doskonale jako surowiec do mrożenia.

c y k o r i a



s z c z a w



seler naciowy



pietruszk naciowa



r a b a r b a r



Rukiew wodna

Cenna roślina wykazująca silne działanie antynowotworowe i kosmetyczne. Zawiera w swoim składzie niezliczoną ilość witamin, minerałów i innych aktywnych substancji. Częścią użytkową są młode liście w smaku przypominające rukolę.

rośliny różne

poziomka



arbuz

brukiew



szparag

seler korzeniowy



Albin, Denar, Dolvi,
Makar, Talar



Zielony młody jęczmień

Oczyszcza, regeneruje i odkwasza oraz uodparnia organizm. Ze względu na wysoką zawartość chlorofilu i antyoksydantów skutecznie zapobiega nowotworom. Zawiera w wysokim stężeniu witaminy (B, C, E) i minerały (magnez, potas, wapń, miedź, cynk, żelazo), a także naturalne hormony i aminokwasy. Wysoka zawartość witaminy B12 jest szczególnie istotna dla wegetarian. Zawartość rozpuszczalnego, łatwo przyswajalnego błonnika pomaga w skutecznym odchudzaniu. Może być spożywany w formie kielków, sproszkowanego soku bądź rozdrobnionej surowej trawy jęczmiennej.



Trawa dla kota

Zawarty w niej błonnik wspomaga trawienie, poprzez oczyszczanie żołądka i jelit z niestrawionych resztek pokarmowych i z sierści. Trawę można wysiewać przez cały rok w płytkich pojemnikach w ziemi lub na warstwie ligniny, utrzymując stałą wilgotność nasion.



kukurydza



fasolnik chiński

Oryginalna, ciekawa i odporna na choroby roślina, w sposobie użytkowania podobna do fasoli szparagowej. Bardzo smaczne strąki o dł. 30-50 cm, najczęściej na wysokich roślinach wymagających podpar. Występują również odmiany karłowe osiągające do 40 cm wysokości.



słonecznik

m i e s z a n k i w a r z y w n e

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom poszerzyliśmy naszą ofertę o mieszanki nasion dedykowane do właścicieli mniejszych ogródków lub działkowców chcących sprawdzić nowe odmiany danych warzyw.



OPAKOWANIA Z TRAWY

ZDOBIĄ SMAKUJĄ LECZĄ


Nowa linia nasion „ZDOBIĄ, SMAKUJĄ, LECZĄ” łączy walory ozdobne i smakowe z poradami na temat prozdrowotnego oddziaływania oferowanych gatunków roślin. O ile powszechnie znane jest ich wykorzystanie ozdobne i kulinarne, o tyle wciąż małą wiedzę posiadamy w zakresie ich oddziaływania na nasz organizm. W dobie zwiększającego się zainteresowania produktami nisko przetworzonymi i naturalnymi jest to szansa na pogłębienie swojej wiedzy i możliwości jej wykorzystania w życiu codziennym. Wszystkie oferowane gatunki posiadają skrócony opis oddziaływania prozdrowotnego. Opakowania całej serii zostały wykonane z biodegradowalnego papieru Graspapier, przy produkcji którego oszczędza się do 90% wody i 80% energii, w porównaniu do tradycyjnej metody.

OPAKOWANIA WYKONANE Z
EKOLOGICZNEGO
PAPIERU
GRASPAPIER



nasiona na taśmie

Linia nasion na ulegającej biodegradacji taśmie wodorozpuszczalnej. Taśma nasienna ułatwia ręczny wysiew i eliminuje pracochłonne przerywanie roślin oraz zabezpiecza prawidłowe odległości między nimi. Ze względu na jednakową głębokość siewu, umożliwia wschody roślin w jednakowym czasie. Zarówno nasiona jak i siewki, w początkowym okresie rozwoju zabezpieczone są przed chorobami grzybowymi. Ze względu na łatwą rozpuszczalność taśmy zaleca się nie wysiewać jej mokrymi rękami oraz podczas deszczu.



Na taśmie z nasionami marchwi i pietruszki są umieszczone dodatkowo, jako rośliny wskaźnikowe, nasiona rzodkiewki.



NASIONA NA TAŚMIE
wodorozpuszczalnej



Nasiona pokryte są całkowicie naturalnym biostymulatorem wzrostu Nano-Gro.

Jest on w pełni bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Uruchamiając mechanizm obrony roślin biostymulator Nano-Gro powoduje:

- wzmocnienie odporności wobec chorób grzybowych i patogenów glebowych,
- zwiększenie energii kiełkowania nasion oraz wzrostu roślin,
- wzrost tolerancji roślin na niekorzystne warunki uprawy (susza, chłody, itp.)
- podniesienie jakości oraz wielkości plonu nawet do 30%.

nasiona
nano-gro



WIĘKSZY
PLON

WIĘKSZA
ODPORNOŚĆ

WIĘKSZY
WIGOR

nano gro®

nasiona otoczkowane

Nasiona wielu gatunków roślin są niewielkie, mają nieregularny kształt, bądź też ich rozmiar jest bardzo zróżnicowany. Otoczkowanie rozwiązuje te problemy. Nasiona pokryte naturalną otoczką są większe, a ich kształt staje się bardziej regularny, co znacznie ułatwia ich precyzyjne wysianie. Ogranicza to potrzebę przerywania roślin w późniejszym okresie ich wzrostu.



**PRECYZYJNY
WYSIEW**





rośliny zielarskie i przyprawowe

Ludzie od wieków uważali zioła za rośliny o tajemnych właściwościach. Przykładowo korzeń mandragory był stosowany w egzorcyzmach, palony rozmaryn jako kadzidło, ziele dąbrowki leczyło kaca, babka była skuteczna na stłuczenia, a krwawnik działał przeciwzapalnie i przeciw przeziębieniowo. Zioła wykorzystywane są w lecznictwie, środkach zapachowych, kosmetykach, a były i kto wie czy dalej nie są wykorzystywane w obrzędach magicznych. Stosowane w przyprawianiu potraw, leczeniu wielu chorób, czy odstraszaniu uciążliwych owadów. Zioła to prawdziwy róg obfitości, który każdy powinien mieć w swoim ogrodzie.







mikrolistki

Mikrolistki (microgreens) to rośliny zbierane zaraz po rozwinięciu pierwszych liści, jednak mają nawet o pięć razy więcej cennych składników niż ich „dorosłe” odpowiedniki. Ich uprawa jest stosunkowo łatwa i to sprawia, że są ciekawą alternatywą dla kiełków. Nasiona różnych rodzajów warzyw lub ziół wysiewane są w podłożu glebowym w ciągu całego roku do doniczek, korytek czy innych pojemników. Jest to propozycja dla osób, które przywiązują dużą wagę do zdrowego odżywiania lub chcących zwiększyć atrakcyjność i smak swoich potraw. Spożywane są nadziemne części pędów z młodymi listkami, które są skoncentrowanym, bardzo bogatym źródłem witamin, przeciwutleniaczy, mikro i makroelementów. Najwyższą wartość wykazują kiedy są spożywane na surowo, mogą być także wykorzystywane do dekoracji potraw. W zależności od gatunku, mikrolistki są gotowe do spożycia już po 7-10 dniach od wysiewu.



bazylia



brokuł



gorczyca



groch



lucerna



mizuna



rzodkiewka



sałata



brukiew



burak



jarmuż



koper



rukola



rzeżucha



słonecznik



szpinak



opakowania dla producentów

Nasiona oferowane w specjalnych, aluminiowych torebkach (doypack) skierowane są do rolników i ogrodników, którzy zajmują się profesjonalną uprawą warzyw. Hermetyczne zamknięcie gwarantuje utrzymanie wysokich parametrów nasion. Dodatkowo wrażliwe gatunki poddawane są ozonowaniu, dzięki czemu zapewniamy ich najwyższą jakość. Nasiona dla producentów oferowane są w opakowaniach od 50 g do 1 kg, jednak na życzenie klienta możemy zaproponować inne gramatury. W ofercie dostępne są również nasiona kalibrowane i otoczkowane.



k w i a t y j e d n o r o c z n e



-  wysiew pod osłoną
-  wysiew do gruntu
-  wysadźnię
-  kwitnienie
-  wysokość rośliny
-  stanowisko słoneczne
-  stanowisko półcieniste
-  stanowisko zacienione
-  kolorystyka

Aksamitka wielkokwiatowa niska
Tagetes erecta nana



       
III-IV V V VI-X 20-30

Aksamitka wielkokwiatowa wysoka (wzniosła)
Tagetes erecta



      
III-IV V V VI-X 50-80

Aksamitka rozplazczą niska
Tagetes patula nana



      
III-IV V V VI-X 15-35

Aksamitka pojedyncza niska typ 'Disco'
Tagetes patula nana



      
III-IV V V VI-X 15-25

Aksamitka wąskolistna
Tagetes tenuifolia



      
III-IV IV-V V VI-X 15-25

Asarina
Asarina scandens



      
II-III V VII-X ~300

Aster karłowy
Callistephus chinensis



      
III-IV V V VII-X 20-35

Aster karłowy Pepite
Callistephus chinensis



      
III-IV V V VII-X 30-35

Aster karłowy Pinokio
Callistephus chinensis



      
III-IV V V VII-X 30-35

**Aster
wysoki
bukietowy**
*Callistephus
chinensis*



**Aster
wysoki
chryzantemowy**
*Callistephus
chinensis*



**Aster
wysoki
igielkowy**
*Callistephus
chinensis*



**Aster
wysoki
igielkowy typ Igel**
*Callistephus
chinensis*



**Aster
wysoki
książęcy**
*Callistephus
chinensis*



**Aster
wysoki
piwoniowy**
*Callistephus
chinensis*



**Aster
wysoki
pomponowy**
*Callistephus
chinensis*



**Balsamina
- Niecierpek**
*Impatiens
balsamina*



Bieluń
*Datura
metel*



**Celożja
grzebleniasta**
*Celosia
argentea
crispata*



**Celożja
pierzasta**
*Celosia
argentea
plumosa*



**Chaber
jednoroczny**
*Centaurea
moschatata*





wylęty pod osłoną



wysiew do gruntu



wysadzenie



kwitnienie



wysokość rośliny



stanowisko słoneczne



stanowisko półcieniste



stanowisko cieniowe



kolorystyka

Chaber - Bławatek

*Centaurus
cyrenus*



IV-V VII-VIII 30-90

Chmiel japoński

Humulus scandens



III-IV V VII-VIII 400-500

Cynia chryzantemowa

*Zinnia elegans
chrysantha*



III-IV V V VI-X 80-90

Cynia dallowa

*Zinnia elegans
dallwajflora*



III-IV V V VI-X 75-80

Cynia meksykańska

*Zinnia
haageana*



III-IV V V VI-X 30-40

Cynia pomponowa

*Zinnia
elegans*



IV V V VI-X 40-50

Czarnuszka damasceńska

*Nigella
damascena*



IV-V VII-VIII 40-50

Czubatka ubiorkolistna

*Brachycome
iberidifolia*



IV VI-IX 30-35

Dalia zmienna pojedyncza


*Dahlia pinnata
Mignon*



III V V VII-X 35-40

**Dalia
pełna i półpełna***Dahlia pinnata*
Ulmata

III-IV V VII-X 30-70

**Diakiew
gwiazdkista***Scabiosa
stellata*

IV VII-IX 40-60

**Diakiew
purpurowa***Scabiosa
atropurpurea*

IV-V VII-X 80-100

**Dynia
ozdobna***Cucurbita
pepo*

V VII-VIII 200-500

**Dynia
ozdobna***Cucurbita pepo*
Turkish Turban

V VII-VIII 200-500

Dzierotka*Clarkia
virgata*

IV-V VII-IX -50

Dziwaczek*Mirabilis
jalapa*

IV V V VII-X 60-75

**Dzwony
Irlandzkie***Motucella
lancea*

III-IV V VII-IX 60-100

**Eszeleja
- Maczek
kalifornijski***Eschscholzia
californica*

IV-V VI-VII 30-50

**Facelia
dzwonkowata***Placella
complanata*

IV-V VI-IX 20-30

**Fasola
ozdobna***Phaseolus
coccineus*

V VI-IX 300-400

**Floks
karłowaty***Phlox
drumondii*

III-IV V VII-X 15-30



wytwór pod osłoną

wytwór do gruntu

wysadzanie

kwiatości

wysokość rośliny

stanowisko słoneczne

stanowisko półcieniste

stanowisko cienie

kolorytyka

Gazania

Gazania rigens



II-III V VI-X 30-40

Gilia główkowa

Gilia capitata



IV VII-IX 40-60

Godecja wielokwiatowa

Godecja grandiflora



IV-V VI-IX 30-40

Goździk chiński

Dianthus chinensis



III-IV V V VII-X 35-40

Goździk ogrodowy Chabaud

Dianthus caryophyllus Chabaud



II-III V V VII-X 40-50

Groszek pachnący

Lathyrus odoratus



V VI-IX 100-200

Kapusta ozdobna

Brassica oleracea



III-IV V V-VI 20-30

Kardiospermum

Kardiospermum halicacabum



II-III V VII-IX ~300

Kobeo pnąca

Cobaea scandens



II-III V VII-X 100-300



wysokość pod osłoną

wysokość do gruntu

wydrążenie

kwitnienie

wysokość rośliny

stanowisko słoneczne

stanowisko półcienie

stanowisko zacienione

kolorytka

Lubin Hartwega

Lupinus Hartwegii



IV-V VII-X 70-80

Łyszczo wylotowy - Gipsówka

Gypsophila elegans



V VI-IX 40-50

Mak polny

Papaver rhoeas



IV-V VII-VIII 40

Mak polny pojedynczy

Papaver rhoeas



III, X-XI V-VII 60-90

Maciejka

Matthiola bicornis



IV-V VI-VIII 20-30

Malope

Malope trifida



IV-V VII-X 100-120

Melampodium błotne

Melampodium paludosum



II-III V V VI-X 30-35

Milek letni

Adonis aestivalis



IV VI-VIII 30-35

Motylek

Schizanthus wiskottensis



III IV-V V VII-IX 20-40

Mrozy - Starzec popielaty

Cineraria maritima



III-IV V 20-35





-  wysiew pod osłoną
-  wysiew do gruntu
-  wysadzenie
-  kwitnienie
-  wysokość rośliny
-  stanowisko słoneczne
-  stanowisko żółciowe
-  stanowisko ciemne
-  kolorystyka

Ostróżka letnia

Dolichium ajacis



-  II-III
-  V
-  V
-  VI-IX
-  50-100

Penstemon

Penstemon hartwegii



-  II-IV
-  V
-  VII-X
-  50-60

Porcelanka

Nemophila



-  V
-  VI-VIII
-  ~20

Portulaka

Portulaca grandiflora



-  V
-  VII-X
-  10-20

Powój trójbarwny

Convolvulus tricolor



-  IV-V
-  VI-X
-  30-40

Przypoludnik

Mesembryanthemum cristatum



-  II-IV
-  V
-  VI-IX
-  10-20

Rącznik

Ricinus communis



-  II-IV
-  V
-  VII-X
-  180-200

Rezeda wonna

Rosella odorata



-  IV-V
-  VII-X
-  30-40

Rudbekia dwubarwna

Rudbeckia hirta



-  II-IV
-  V
-  VII-X
-  90-100



III-IV V V VII-X 15-20



IV-V VII-IX 60-200



IV-V VII-IX 60-200



IV-V VI-X 10-25



IV V V VII-IX 30-60



V VI-IX 20-60



I-III V VI-X 15-30



II-III V VI-X 60-80



III-IV V VI-X 40-60



III-IV V V VII-IX 60-120



IV V V VII-X 40-100



IV-V VII-X 60-100



wytłoczone pod osłoną



wytłoczone do gruntu



wytłoczone



kwitnienie



wysokość rośliny



stanowisko słoneczne



stanowisko półcieniste



stanowisko cienie



kolorytyka

Tolpis

Tolpis
barbata

15.III-15.V VI-IX 30-60

Tujalka
zmiennaSalpiglossis
sinuata

IV V V VII-IX 60-70

Tunbergia

Tunbergia
alata

II-IV V VI-IX -150

Tytoń
ozdobnyNicotiana
glauca

II-IV V V VII-IX 40-90

Ubiorek

ibers



IV-VI VI-VIII 25-30

Uczep
złocistyBidens
aurora

II-IV V VI-X 60-100

Wenidium

Wenidium
fastuosum

IV-VI VI-IX 50-70

Werbena

Verbena
hybrida

II-III V VI-X 20-40

Werbena
zwisającaVerbena hybrida
pendula

II-III V VI-X 20-40

**Werbena
patagońska**

*Verbena
bonariensis*



II-III XI 1/2 V VI-XI 80-150

Wiecznik

*Gomphrena
globosa*



III-IV V VI-X 20-30

**Wileczolecz
białobrzegi**

*Euphorbia
marginata*



III-IV IV V V-X 50-70

**Wilec
purpurowy**

*Ipomoea
purpurea*



IV-V VII-IX 280-300

**Zatrwan
Suworowa**

*Linum
suworowii*



II-IV V VII-X 70-80

**Zatrwan
wrebnny**

*Linum
sinuatum*



III-IV V V VII-X 40-50

**Złocien
maruna**

*Chrysanthemum
parthenium*



IV V VI-VIII 15-25

**Złocien
polny**

*Chrysanthemum
segetum*



IV VII-IX -50

**Złocien
trójbarwny**

*Chrysanthemum
cecinatum*



IV V V VI-IX 50-60

**Złotokwiat
- Dimorfoteka**

*Dimorphoteca
aureanifolia*



IV-V VI-X 25-40

Zeniszek

*Ageratum
houstonianum*



II-III V VI-X 10-20

Zmijowiec

*Echium
plantaginifolium*



IV-V VI-X 30-35

kwiaty dwuletnie i byliny

wytłoczone
pod osłonąwytłoczone
do gruntu

wytłoczone



kwitnienie

wysokość
roślinystanowisko
słonecznestanowisko
półcienistestanowisko
cieńskie

kolorytyka



**Aster
alpejski**

*Aster
alpinus*



IV-VII IX V-VI 25-30

**Aster
gawędka**

*Aster
anellus*



IV-V VII-IX VIII-X 40-50

**Bratek
wielkokwiatowy**

*Viola
wittrockiana*



VI-VIII IX V-X 15-25

**Bratek
Rokoko**

*Viola
wittrockiana*



VI-VIII IX V-VII 15-20

**Chaber
wielkokwiatowy**

*Centaurea
macrocephala*



V-VI IX VII-VIII 80-100

**Dziakiew
kaukaska**

*Scabiosa
caucasica*



V-VI IX VII-IX 50-70

**Dzwonek
ogrodowy**

*Campanula
medium*



V-VI IX VI-VIII 40-50

**Dzwonek
karpacki**

*Campanula
carpatiae*



V-VI IX VI-IX ~25

**Dzwonek
skupiony**

*Campanula
glomerata*



V-VI IX VI-VIII 50-60

**Dzwonek
brzoskwiolistny**

*Campanula
persicifolia*



V-VI IX VI-VIII 50-80

**Fiolek
rogaty**

*Viola
cornuta*



V-VII IX V-X 15-20

**Firletka
chalecedońska**

*Lychnis
chalecedonica*



V-VI VII-IX VI-VIII 70-100

**Gallardia
- Działwa**

*Gallardia
aristata*



V-VI IX VI-IX 40-80

71

STOŁO

Gęsiówka

*Arabis
spina*



IV-VI VIII-IX IV-VI 20-30

**Goździk
ogrodowy**

*Dianthus
caryophyllus*



V-VI VIII VI-VIII 40-60

**Goździk
brodaty**

*Dianthus
barbatus*



V-VI VII-IX VI-VIII 25-60

**Goździk
kropkowany**

*Dianthus
deltoideus*



V-VII IX VI-VIII 15-25

**Goździk
pierzasty**

*Dianthus
plumarius*



IV-VI X VI-VII 20-30

**Goździk
siny**

*Dianthus
grabenopolitanus*



VI-VII IX V-VII 15-20

**Groszek
szerokolistny**

*Lathyrus
latifolius*



IV-V VI-VIII 200

**Karczoch
hiszpański**

*Cynara
cardunculus*



II-III V VII-IX ~160



-  wysiada pod osłoną
-  wysiada do gruntu
-  wytężanie
-  kwitnienie
-  wysokość rośliny
-  stanowisko słoneczne
-  stanowisko półcieniste
-  stanowisko zacienione
-  kolorytyka

Kocimiętka

Nepeta mussini



-  V-VI
-  VIII-IX
-  V-IX
-  30-50
- 

Krwawnik pospolity

Achillea millefolium



-  V-VI
-  VIII-IX
-  VI-IX
-  40-60
- 

Kuklik chilijski

Geum chilense



-  III-IV
-  VIII-IX
-  VI-VIII
-  40-60
- 

Kupidynek

Catananche caerulea



-  III-IV
-  VII-VIII
-  VII-IX
-  40-60
- 

Len trwały

Linum perenne



-  IV-V
-  VIII-IX
-  60-100
- 

Lepnica

Silene orientalis



-  IV-V
-  IX
-  VI-IX
-  60-70
- 

Lepnica baldaszkowa

Silene aemula



-  V-VI
-  V
-  VI-VII
-  30-40
- 

Liatra kłosowa

Liatris spicata



-  IV-VI
-  IX
-  VI-VIII
-  50-80
- 

Łubin trwały

Lupinus polyphyllos Russell



-  IV-V
-  VI-VIII
-  100-120
- 

Łyszczec wiechowaty

Cynophila paniculata



-  III-V
-  IX
-  VI-VIII
-  40-120
- 





Rozwar wielkokwiatowy
Platycodon grandiflorus



Rudbekia purpurowa
Rudbeckia purpurea



Skalnica
Saxifraga arendsi



Słoneczniczek
Helianthus scabra



Smagliczka skalna
Alyssum saxatile



Smółka pospolita
Lysichiton viscaria



Stokrotka łąkowa (dzika)
Bellis perennis



Stokrotka pomponowa
Ekis perennis



Stokrotka wielkokwiatowa
Bellis perennis



Szarotka alpejska
Leontopodium alpinum



Szczęć
Dipsacus sativus



Trawa pampasowa
Cortaderia selkiana





-  wybite pod osłoną
-  wybite do gruntu
-  wykładanie
-  kwitnienie
-  wysokość rośliny
-  stanowisko słoneczne
-  stanowisko półcieniste
-  stanowisko zacienione
-  kolorystyka

Trojeść

Asclepias tuberosa



    IV-VII VII-X VII-IX -70

Trytoma

Kasprolla



    V-VI VII-VIII VI-IX 80-130

Ubjorek wiecznie zielony

Iberis sempervirens



    IV-VI IX IV-VI 25-30

Wieczornik damski

Hesperis matronalis



    IV-V V-VI 80-90

Wiesiołek

Oenothera lutea



    III V VI-IX 20-30

Zatrwian tatarski

Linum catharticum



    IV-V VII-IX VI-IX 35-60

Zawciąg

Armeria maritima



    V-VIII IX IV-VI 15-20

Złocien różowy

Chrysanthemum roseum



    V-VI IX VI-VIII 80-90

Złocien właściwy

Chrysanthemum leucanthemum



    V-VI IX VI-VIII 60-120

Zagwin

Aubrieta cultorum hybrida



    IV VIII-IX V-VI 10-15

kwiaty szklarniowe

**Begonia
stałe kwitnąca**

*Begonia
semperflorens*



**Fiolek alpejski
- Cyklamen**

*Cyclamen
persicum
giganteum*



Koleus

*Coleus
blamei*



**Męczennica
błękitna**

*Passiflora
caerulea*



Pelargonium

*Pelargonium
zonale*



**Petunia
zwisająca
- Fortunia**

*Petunia Fortunia
hybr. grand.*



**Petunia
strzępiasta
(fryzowana)**

*Petunia hybrida
fimbriata*



**Petunia
ogrodowa**

*Petunia hybrida
grandiflora nana*



mieszanki kwiatowe



t r a w y g a z o n o w e



uniwersalna

Uniwersalna mieszanka o wszechstronnym zastosowaniu, składająca się z podstawowych gatunków traw. Charakteryzuje się szybkimi wschodami oraz dobrym zadarnianiem, dzięki zastosowaniu wiechliny łąkowej. Z mieszanki uzyskamy ładny trawnik o intensywnej zielonej barwie i dużej odporności na deptanie.

rekreacyjna

Mieszanka polecana do zakładania użytkowych trawników przydomowych oraz większych powierzchni służących do czynnego wypoczynku. Typowa mieszanka na tereny o umiarkowanym intensywnym użytkowaniu. Polecana jest wszędzie tam, gdzie potrzebna jest zwarta murawa służąca do wypoczynku, relaksu, czy rodzinnej zabawy. Nadaje się do obsiewu placów zabaw i terenów sportowych. Charakteryzuje się stosunkowo wolnym odrastaniem.



dekoracyjna

Starannie skomponowana mieszanka o wspaniałych walorach dekoracyjnych dla osób chcących uzyskać efekt „dywanu”. Charakteryzuje się wolnym przyrostem, wyjątkowo równą darnią i dużą odpornością na przemarzanie. Trawniki wymagają jednak starannej pielęgnacji. Idealna do terenów o mniej intensywnym użytkowaniu, ozdobnych trawników i zieleńców, jako tło dla rabat kwiatowych i żywopłotów. Zaleca się wysiew na glebach żyznych.

sportowa

Mieszanka jest przeznaczona na boiska i tereny sportowe lub trawniki intensywnie użytkowane, np. place zabaw czy tereny campingowe. Zawartość wiechliny łąkowej powoduje powstanie gęstej i wytrzymałej darni. Z kolei, żylica trwała wpływa na szybką regenerację murawy. Starannie dobrane odmiany sprawiają, że mieszanka doskonale sprawdza się w polskich warunkach klimatycznych. Mieszanka odporna na wymarzenie.



ekspozytory

de luxe

WYMIARY:
wys.: 193 cm
(z toperem: 217 cm)
szer.: 104 cm
głęb.: 41 cm



standard

WYMIARY:
wys.: 189 cm
(z toperem: 205 cm)
szer.: 74 cm
głęb.: 41 cm



naładowy standard

WYMIARY:
wys.: 54 cm
(z toperem: 68 cm)
szer.: 40 cm
głęb.: 27 cm



kiełkowy

WYMIARY:
wys.: 120 cm
(z toperem: 145 cm)
szer.: 63,5 cm
głęb.: 42,5 cm



naładowy

kiełkowy

WYMIARY:
wys.: 54 cm
(z toperem: 68 cm)
szer.: 40 cm
głęb.: 27 cm



graspapier

WYMIARY:
wys.: 72 cm
szer.: 51 cm
głęb.: 22 cm



TORSEED

Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego

i Szkółkarstwa S.A. w Toruniu

ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń

tel.: +48 56 658 48 00

fax: +48 56 659 89 31

marketing@torseed.pl

www.torseed.pl